

TRADE DISCOUNT 25 %  
9. APR. 1937  
HORTICULTEURS . RABAIS 25 %  
HANDELSGAERTNER . RABATT 25 %

PLANTES  
ALPINES  
& VIVACES

1937=1938

JARDIN ALPIN "FLORAIRE" (1882)

H. Corrévon & Fils

CHÊNE-BOURG - GENÈVE (SUISSE)



# CONDITIONS DE VENTE

Ce catalogue annule tous les précédents

## EXPÉDITIONS

Nos marchandises sont livrables à notre établissement. Elles sont expédiées par nos soins, comme colis postal ou par chemin de fer, mais aux risques du destinataire. Nos clients voudront donc bien nous donner toutes les indications utiles pour faciliter les envois; faute de renseignements, nous choisirons le mode d'expédition qui nous paraît le plus avantageux, sans cependant prendre de responsabilité.

## EMBALLAGES

Sont facturés aux prix coûtant, et ne sont pas repris.

## GARANTIES

Toutes nos plantes sont emballées avec le plus grand soin et sont en pleine santé; leur reprise dépendant des soins donnés à l'arrivée (préparation du terrain, etc.), nous ne pouvons accepter aucune responsabilité à ce sujet. Nous garantissons l'authenticité des plantes livrées, notre responsabilité se bornant au remplacement des espèces dont la fausse détermination serait prouvée.

## CORRESPONDANCE

Nous prions instamment nos correspondants d'affranchir suffisamment leurs lettres et de donner leur adresse d'une manière lisible et complète. Dans la règle nous n'accusons réception que des commandes qui ne peuvent être exécutées dans la semaine qui suit.

## PAIEMENTS

Nos factures sont payables au comptant, soit par chèque, mandat postal, billets de banque recommandés, ou virement au compte de chèque postal I. 2328, Genève. Passé le délai de 30 jours, nous disposons par traite ou remboursement postal, après avis; les frais de recouvrement sont à la charge du client.

**Nous consentons un rabais de 5% sur les commandes de 50 francs et de 10% sur les commandes de 100 francs.**

Nous facturons 10 plantes pour tout achat de 12 d'une même espèce.

## COLLECTIONS

Pour faciliter ceux de nos clients qui seraient embarrassés dans le choix de leurs plantes, nous proposons des collections à notre choix, qui seront établies d'après les indications données par le client sur le climat, la nature du sol, l'exposition et selon la liste ci-dessous: Plantes pour

FOERSTER Rocailles,  
Bordures,  
Bibliothek Murs fleuris,  
Museum Bornim Chemins dallés,

Sign.  
au prix de:

532 K

Talus arides,  
Fleurs coupées,  
Sous-bois,  
Lieux humides,

ou toutes autres conditions possibles,  
100 plantes étiquetées Fr. 45.—  
50 » » » 25.—  
25 » » » 15.—  
12 » » » 7.50

Voir en outre nos collections d'Orchidées, de Fougères & d'Arbustes, page 33 à 36.



# ABREVIATIONS

Aq	=	Plantes aquatiques	=	Waterplants.
Arom	=	» aromatiques	=	Aromatic herbs.
Bo	=	» de bordures	=	For edging.
H	=	» aimant l'humidité	=	For moisture.
Med	=	» officinales	=	Medicinal plants.
Mel	=	» mellifères	=	Good for bees.
M	=	» pour murs ou fentes de rochers	=	Wallplants.
Mo	=	» pour moraine	=	For moraine.
N	=	» à placer au nord	=	North situation.
O	=	» pour l'ombre	=	Shade.
Pal	=	» pour marécage	=	Bog.
Pr	=	» pour prairie alpestre	=	Alpine meadow.
R	=	» pour rocailles	=	Rockery.
S	=	» aimant le soleil	=	Sun.
Sp	=	» pour Sphagnum	=	Sphagnum culture.
T	=	» pour tourbière	=	For peat bog.
Tap	=	» tapissantes	=	Creeping plants.
V	=	» vivaces décoratives	=	Herbaceous borders.
△	=	» délicates; à couvrir l'hiver	=	Tender plants.
†	=	» envahissantes	=	Invading plants.
+	=	» pour fleurs coupées	=	For cut flowers.
§	=	» grimpantes	=	Climbing plants.
□	=	» pour sous-bois	=	Wild garden, woodland garden.
●	=	» de terre de bruyère	=	Acid soil.




Photo H. Fuchs, Versailles

Cliché *Revue Horticole Suisse*.

*Rocaille construite par notre personnel aux « Bastions ».  
(Achetée par la Ville de Genève).*

Nous nous chargeons de toute création, réfection, entretien de rocaille, plantations, confection de murs fleuris, etc. Nos spécialistes vous donneront entière satisfaction.

**DEVIS SANS ENGAGEMENTS**



# PLANTES

## ALPINES, VIVACES, SAXATILES

Prix en francs suisses.

Explication des signes page 1.

	Fr.
<b>Acaena</b> adscendens, Buchanani, fissistipula, microphylla, ovalifolia . . . . .	0,50
— glaneaphylla . . . . .	0,75
— multifida . . . . .	
— ovina . . . . .	
— pilosa . . . . .	
— sericea . . . . .	
— trifida . . . . .	

Plantes naines et rampantes; merveilleux gazon dans les lieux ombragés ou au plein soleil.

△ <b>Acanthosonehus</b> cervicornis . . . . .	1,—
<b>Acantholimon</b> androsaceum . . . . .	1,—
— creticum . . . . .	1,—
— glumaceum . . . . .	1,—
— graminifolium (Echinus) . . . . .	1,—
— venustum . . . . .	1,—

Excellentes plantes pour rocaille ou mur au grand soleil. Fleurs roses, feuilles étroites et rigides, en touffes serrées.

<b>Acanthus</b> mollis . . . . .	0,50
— spinosissimus . . . . .	0,50

L'Acanthe des artistes grecs demande le plein soleil et un sol profond.

R <b>Acanthopanax</b> divaricatum . . . . .	1,—
---	-----

### ACHILLÉES

a) Fleurs blanches et feuillage plus ou moins argenté.

R Tap <b>Achillea</b> ageratifolia . . . . .	0,50
R — argentea . . . . .	0,50
R M — Clavenae . . . . .	0,50
R — clusiana . . . . .	0,60
M — Grisebachii . . . . .	1,—
R — holosericea . . . . .	0,60
R — Jaborneggi . . . . .	1,—
Bo — Kellereri . . . . .	0,50
R Tap — macedonica . . . . .	0,50
Pr R — Millefolium . . . . .	0,50
— — Cerise Queen (rouge cerise) . . . . .	0,50
— Millefolium Kelwayi (carmine) . . . . .	0,60
Mo — moschata . . . . .	1,—
R M — rupestris . . . . .	0,75
R M — saracenica . . . . .	1,—
M Tap — umbellata . . . . .	0,60

b) Fleurs jaunes.

+ O <b>Achillea</b> filipendulina . . . . .	0,50
— — Parker's var. . . . .	0,50
R — Lewisii (jaune soufre) . . . . .	1,—
R † — sericea . . . . .	0,50
R Tap M — tomentosa . . . . .	0,50

Plantes solides et fleurissant tout l'été; Achillea filipendulina est l'une des meilleures plantes pour plates-bandes et bouquets; A. sericea, Ageratum et tomentosa sont excellentes pour la garniture des talus secs et endroits arides.

	Fr.
<b>Aconitum</b> Anthora . . . . .	0,50
— Fischeri . . . . .	0,60
— Lycoctonum . . . . .	0,50
— Napellus . . . . .	0,50
— — album . . . . .	1,50
— paniculatum . . . . .	0,50
— — album . . . . .	2,50
— praecox . . . . .	0,60
— rostratum . . . . .	0,60
— septentrionale . . . . .	0,50
— variegatum . . . . .	0,50
— Wilsoni . . . . .	0,60

Bonnes plantes vivaces pour ombre ou demi-ombre.

O <b>Actaea</b> rubra . . . . .	1,—
V <b>Adenophora</b> Bulleyana . . . . .	0,75
— diploantha . . . . .	0,75
V — Farreri . . . . .	1,—
R V — lilifolia . . . . .	0,50
V — marsupiflora . . . . .	1,—
— palustris . . . . .	0,75
R V — Potanini . . . . .	0,50

Plantes vivaces à clochettes bleutées ou lilas.

□ O <b>Adenostyles</b> albifrons . . . . .	0,50
O — alpina (glabra) . . . . .	0,75
R S <b>Adonis</b> pyrenaica . . . . .	1,—
R S — vernalis . . . . .	0,75

Grosses fleurs jaunes, feuillage finement divisé.

O □ <b>Adoxa</b> Moschatellina . . . . .	0,50
O † <b>Aegopodium</b> variegatum . . . . .	0,25
<b>Aethionema</b> amoenum . . . . .	0,75
— cardiophyllum . . . . .	1,—
— carneum . . . . .	0,60
— coridifolium (Iberis jucunda) . . . . .	1,—
— florariense (rose vif) . . . . .	0,75
— grandiflorum . . . . .	0,60
— iberideum . . . . .	0,50
— Koenigii . . . . .	0,75
— Kotschy . . . . .	1,—
— oppositifolium . . . . .	1,—
— persicum . . . . .	0,50
— pulchellum . . . . .	0,60
— rotundifolium . . . . .	0,60
— saxatile . . . . .	0,50
— schistosum . . . . .	1,—
— stylosum . . . . .	0,75
— Thomasianum . . . . .	1,50

Excellentes pour murs et rochers au soleil.

R S <b>Aethopappus</b> pulcherrimus . . . . .	2,—
R <b>Agave</b> Parryi . . . . .	2,50
R — virginica (rustique) . . . . .	1,50
† <b>Ajuga</b> genevensis . . . . .	0,25
R — metallica crispa . . . . .	1,—
R — pyramidalis . . . . .	1,—



**Ajuga (suite)**

Fr.

†	— reptans . . . . .	0,25
	— fol. var. . . . .	0,50
	— fl. roses . . . . .	0,50
	— varicolor . . . . .	1,—

Les Ajuga (Bugles) ont des épis à fleurs bleues, très décoratives chez les A. genevensis et reptans qui sont les espèces envahissantes et très propres à garnir rapidement un talus aride ou un rocher ensoleillé; sol maigre.

Pr R	<b>Alchemilla alpina, splendens et vulgaris</b> . . . . .	0,50
------	---	------



Aethionema grandiflorum

**Allium**

angulosum . . .	0,50	ochroleucum . . .	0,50
azureum . . .	0,75	Ostrowskianum . . .	1,—
cyaneum . . .	0,60	pedemontanum . . .	0,75
flavum, jaune . . .	0,60	pyrenaicum . . .	0,50
giganteum . . .	1,—	roseum . . .	1,—
karataviense . . .	0,50	ursinum . . .	0,50
Moly . . . . .	0,50	valdense . . .	0,50

Alsine, voir Arenaria.

M Bo R	<b>Alyssum saxatile, citrinum, compactum et fl. pleno</b> . . . . .	0,50
R M	— alpestre, argenteum, halimifolium, montanum, serpyllifolium, speciosum, spinosum, Wierzbickii . . . . .	0,50
M R	— Boryanum, cantabricum, flexicaule, Lapeyrouisianum, longicaule, Moellendorffianum, ovirense, repens, Rochelii, rupestre, spinosum var. roseum, Wulfenianum . . . . .	0,60

Vigoureuses plantes pour rocailles ou murs. Fleurs principalement jaunes.

R S	<b>Anagallis linifolia</b> . . . . .	Fr. 0,75
	Le fameux mouron rouge.	
+	<b>Anchusa italica</b> « Dropmore » . . . . .	0,60
	Grande plante vivace aux fleurs bleu intense.	
+ O	— myosotidiflora . . . . .	0,75
O Pal	<b>Andromeda polifolia</b> . . . . .	1,—
R M	<b>Andrachne telephioides</b> . . . . .	0,50

**ANDROSACES**

## a) Terrestres.

**Androsace**

arachnoidea . . .	0,75	praetutiana . . .	0,75
armeniaca . . .	1,—	primuloides . . .	0,50
brigantiaca . . .	0,60	sarmentosa . . .	0,50
carnea . . . . .	0,50	— nana . . .	0,50
Chamaejasme . . .	0,60	saxifragaeformis	0,75
Chumbyi . . . . .	0,50	sempervivoides	0,50
foliosa . . . . .	1,—	strigilosa . . .	1,—
lactea . . . . .	0,50	tibetica . . . . .	1,—
Laggeri . . . . .	0,75	villosa . . . . .	0,50
lanuginosa . . .	0,60	Vitaliana . . . .	0,50
obtusifolia . . .	0,50	Watkinsii . . . .	0,50
oculata . . . . .	0,60	yunnanensis . .	0,50
penicellata . . .	0,75		

Soleil, sol pierreux et sableux, bonne niche dans la rocaille. On peut les cultiver en pleine terre, en rocaille. Rosettes lâches.

## b) Saxatiles.

<b>Androsace Charpentieri (brevis)</b>	0,50
— ciliata . . . . .	1,50
— cylindrica . . . . .	3,—
— Gaudinii . . . . .	1,—
— glacialis (alpina) . . . . .	2,50
— Hausmannii . . . . .	2,50
— helvetica . . . . .	2,50
— hirtella . . . . .	2,50
— pubescens . . . . .	2,50
— tridentata . . . . .	1,—
— Wulfeniana . . . . .	1,50

Fentes de muraille ou de rocaille, au levant et au couchant; mélange très sableux. Rosettes serrées et compactes. Fleurs plaquées sur la touffe.

**ANMONES**

## a) Groupe Hepatica.

<b>Anemone angulosa</b> . . . . .	0,75
— coerulea plena . . . . .	2,50
— Hepatica . . . . .	0,50
— — vars. alba et rosea . . . . .	0,75
— rosea plena . . . . .	1,—
— transsilvanica . . . . .	0,75

Taillis ou sous-bois, bordures à l'ombre ou au soleil.

## b) Groupe Pulsatilla.

<b>Anemone albana</b> . . . . .	1,—
— alpina . . . . .	1,—
— amoena . . . . .	1,—
— armena . . . . .	1,—
— Farreri . . . . .	1,—
— georgica . . . . .	1,—



	Fr.
<b>Anémone (suite)</b>	
— grandis . . . . .	1,—
— Halleri . . . . .	1,50
— montana . . . . .	0,75
— patens . . . . .	2,50
— pratensis . . . . .	1,—
— propera . . . . .	0,75
— Pulsatilla . . . . .	0,50
— vars. alba et gran-	
— difflora . . . . .	1,50
— rubra . . . . .	0,75
— slavica . . . . .	1,—
— styriaca . . . . .	1,—
— sulfurea . . . . .	1,50
— V. der Elst . . . . .	2,50
— vernalis . . . . .	0,75

Sol riche en humus et soleil; plate-bande ou rocaille. Ce sont généralement de grosses fleurs velues, violettes, jaunes ou blanches.

[[c] Anémones diverses.

R O	<b>Anemone apennina</b> . . . . .	0,50
R	— baicalensis . . . . .	0,75
R	— baldensis . . . . .	0,60
R	— blanda . . . . .	0,50
	— scythina . . . . .	0,75
R	— coronaria . . . . .	0,50
R	— dahurica . . . . .	0,75
S	— decapeta . . . . .	0,75
R †	— dichotoma(pennsylvanica) . . . . .	0,50
R	— flaccida . . . . .	1,—
R	— fulgens . . . . .	0,50
R O	— intermedia . . . . .	1,50
V +	— japonica . . . . .	0,60
	— alba . . . . .	0,60
	— à fl. doubles . . . . .	0,75
	— à gr. fleurs . . . . .	0,75

Belles plantes vivaces de grande taille, fleurissant jusqu'aux gelées.

R	— Lavalley . . . . .	1,50
R	— magellanica . . . . .	1,50
R Pr	— narcissiflora . . . . .	1,—
R □	— nemorosa . . . . .	0,50
	— var. carminea, fl. pl.	
	— et monstrosa . . . . .	0,75
	— palmata . . . . .	1,50
	— ranunculoides . . . . .	0,50
R H	— rivularis . . . . .	1,—
R	— Robinsoniana . . . . .	1,—
R	— rupestris . . . . .	1,50
R	— rupicola . . . . .	1,50
R O	— sylvestris . . . . .	0,50
O	— trifolia . . . . .	0,75
R	— villosissima . . . . .	2,50
R	<b>Angelica Archangelica</b> . . . . .	1,50
R Tap	<b>Antennaria alpina, australis,</b>	
	<b>dioica, plantaginea, rhodantha</b>	0,50

Plantes tapissantes au feuillage argenté.

R	<b>Anthemis carpathica</b> . . . . .	1,—
Med	— nobilis (camomille). . . . .	0,50
V	— tinctoria (jaune d'or) . . . . .	0,50
R	<b>Anthericum Liliago</b> . . . . .	0,50
	— var. major . . . . .	1,—
R S	— ramosum . . . . .	0,50

Ce sont des Liliacées à fleurs blanches, très nombreuses chez ramosum, qui est très recommandable; soleil, pleine terre, ou rochers.

	Fr.
<b>Anthyllis montana et var. car-</b>	
<b>minea</b> . . . . .	0,50
Très belles plantes à feuillage grisâtre, à fleurs rose vif, très odorantes; rochers ou pleine terre; soleil.	

<b>Antirrhinum Asarina</b> . . . . .	0,50
— glutinosum . . . . .	0,50
— molle (d'Andorre) . . . . .	0,50
— sempervirens . . . . .	0,75

Fentes de rochers ou murs; soleil.

R S	<b>Aphyllanthes monspeliensis</b> . . . . .	0,50
R	<b>Apios tuberosa</b> . . . . .	1,50
†	<b>Apocynum androsaemifolium</b> . . . . .	0,50
Aq	<b>Aponogeton distachyum</b> . . . . .	1,—
	<b>Aquilegia alpina (vraie)</b> . . . . .	1,—
	— akitensis (Japon) . . . . .	2,50
	— arctica (formosa) . . . . .	1,50
	— atrata . . . . .	0,50
	— benacensis . . . . .	1,—
	— Bertolonii . . . . .	1,50
	— californica . . . . .	0,50
	— canadensis . . . . .	0,50
	— chrysantha . . . . .	0,75
	— coerulea . . . . .	0,75
	— hybrida . . . . .	0,75
	— discolor . . . . .	1,—
	— Einseleana . . . . .	0,50
	— flabellata nana . . . . .	1,—
	— glandulosa vera . . . . .	1,—
	— grata . . . . .	1,—
	— hybrides Floraire . . . . .	0,50
	— olympica . . . . .	1,—
	— oxysepala . . . . .	1,50
	— pyrenaica . . . . .	1,—
	— Reuteri vera . . . . .	1,—
	— Skinneri . . . . .	0,75
	— transsilvanica . . . . .	1,—
	— viridiflora . . . . .	1,50
	— vulgaris . . . . .	0,50

Les Ancolies sont d'entre les meilleures plantes du printemps; culture facile; mi-ombre ou sous-bois, rocaille, pleine terre, même au soleil. Les A. alpina, Bertolinii, coerulea, pyrenaica, glandulosa, Reuteri et transsilvanica, plus délicates, exigent un milieu frais, mi-ombre, un sol poreux et bien drainé.

R Bo Tap	<b>Arabis albida (Corbeille d'Argent)</b>	0,25
	— fl. pl. . . . .	0,50
R M	— alpina . . . . .	0,50
	— Rosabella . . . . .	0,60
R	— androsacea . . . . .	0,75
R	— aubrietioides . . . . .	0,50
R	— carduchorum (Draba Gi-	
	gas) . . . . .	0,50
R	— Kellereri . . . . .	0,50
R Tap	— procurrens . . . . .	0,50
R M	— rosea . . . . .	0,50
R Tap	— vochinensis . . . . .	0,50
R ●	<b>Arctostaphylos alpina</b> . . . . .	1,50
R Tap S	— Uva-ursi . . . . .	1,50

Arbustes rampants à baies rouges ou noires.

**Arenaria** Arduini, Armeriastrum, balearica, Bauhinorum, capitata, caucasica, congesta, gracilis, graminifolia, grandiflora, hirsuta, Jooi, Hookeri, juniperina, Koriniana, lanceolata, laricifolia, Ledebouriana, liniflora, montana, montana grandiflora, parnassica, pinifolia, pungens, purpurascens, pulvinata, recurva,



	Fr.
rigida, Rosani, rotundifolia, sajanensis, saxifraga, Scouleri, Steveniana, stricta, stygia, tetraquetra (0,75), verna . . . . .	0,50

Les Arenaria ou Alsine sont de petites plantes gazonnantes, tapissant le sol et produisant une infinité de fleurs blanches (roses chez purpurascens); on les nomme parfois *mousse fleurie*; mai-juillet, soleil. Presque toutes sont bonnes pour le mur et la rocaille.

R	<b>Arisarum</b> vulgare . . . . .	1,50
†	<b>Aristolochia</b> Clematidis . . . . .	0,50

R	Armeria		
alpina . . . . .	0,50	sardoa . . . . .	0,50
« Bees' Ruby » . . . . .	0,75	sibirica . . . . .	0,50
caespitosa . . . . .	1,—	stenophylla . . . . .	0,50
corsica . . . . .	0,75	vulgaris . . . . .	0,50
macrophylla . . . . .	0,50	— alba . . . . .	0,50
Mülleri . . . . .	1,—	Welwitschii . . . . .	0,50
rumelica . . . . .	0,50		

Gazon d'Espagne. Robustes plantes à fleurs généralement roses, feuilles étroites, restant vertes toute l'année.

R	<b>Arnebia</b> echioides . . . . .	1,50
	<b>Arnica</b> montana . . . . .	0,75

Sol poreux et riche en humus.

R Mo	<b>Aronice</b> scorpioides . . . . .	1,50
	— — var. Correvonianum . . . . .	2,50

Med	<b>Artemisia</b> Abrotanum . . . . .	1,50
-----	--------------------------------------	------

R	— absinthioides . . . . .	1,—
---	---------------------------	-----

Rs	— arborea . . . . .	1,50
----	---------------------	------

R	— austriaca X . . . . .	1,—
---	-------------------------	-----

R Med	— camphorata . . . . .	0,50
-------	------------------------	------

R M	— frigida X . . . . .	1,—
-----	-----------------------	-----

	— gallica . . . . .	1,50
--	---------------------	------

R Mo	— glacialis X . . . . .	1,—
------	-------------------------	-----

R	— glauca . . . . .	1,—
---	--------------------	-----

R M	— granatensis X . . . . .	1,—
-----	---------------------------	-----

R M	— maritima X . . . . .	0,75
-----	------------------------	------

R Mo	— Mutellina X . . . . .	1,—
------	-------------------------	-----

R M	— pedemontana X (laxa) . . . . .	1,—
-----	----------------------------------	-----

	— petrosa . . . . .	1,—
--	---------------------	-----

R M	— Roezlii X . . . . .	0,75
-----	-----------------------	------

R	— rupestris . . . . .	1,—
---	-----------------------	-----

R	— sericea . . . . .	0,75
---	---------------------	------

M Mo	— spicata, <i>orai</i> Genépi X . . . . .	1,—
------	---	-----

R	— splendens . . . . .	1,—
---	-----------------------	-----

R	— Stelleriana X . . . . .	1,50
---	---------------------------	------

## ASTERS

### a) Nains, pour rocaille.

	Fr.
<b>Aster</b> alpinus . . . . .	0,50
— » albus . . . . .	0,50
— Douglasii . . . . .	1,—
— pyrenaicus . . . . .	1,—

<b>Aster</b> alpinus roseus . . . . .	0,50
— » altaicus . . . . .	0,50
— Purdomii . . . . .	1,50
— yunnanensis . . . . .	0,75

### b) Asters divers.

<b>Aster</b> amplexicaulis ruber, 100 cm., carmin brillant . . . . .	0,60
— caespitosus purpureus, 40 cm., rose pourpre . . . . .	0,50
— cordifolius elegans, 120 cm., panicules de petites fleurs blanches, léger . . . . .	0,50
— ericoides, 80 cm., petites fleurs blanches . . . . .	0,50
— Farreri, 40 cm., très belles fleurs bleu foncé, centre orange . . . . .	0,75
— Frikartii, 80 cm., très belle espèce d'un bleu ciel brillant, très florifère . . . . .	0,75
— hyssopifolius, 60 cm., jaune d'or . . . . .	0,50
— hybridus luteus, 60 cm., petites fleurs jaune paille . . . . .	0,50
— racemosus compactus, 40 cm., petites fleurs bleues . . . . .	0,75

## Artemisia (suite)

R	— tridentata . . . . .	1,50
R M	— vallesiaca X . . . . .	0,75

Les espèces marquées X sont naines et ont le feuillage argenté et finement divisé.

Les Armoises sont de gracieuses composées, fortement aromatiques, dont plusieurs très appréciées en pharmacie. Le vrai Genépi est le plus réputé; mais sa culture est difficile et son congénère A. Mutellina, qui en diffère peu quant aux qualités et offre le même aspect, lui est préféré dans les rocailles. Soleil; sol sableux et caillouteux, profond, bien drainé.

O	<b>Arum</b> Dracunculus . . . . .	0,50
O	— corsicum . . . . .	1,—
O	— italicum . . . . .	0,50
O	— maculatum . . . . .	0,50
O	— proboscideum . . . . .	1,—

<b>Asarum</b> Beali . . . . .	1,—
— canadense, europaeum, caucasicum, caudatum . . . . .	0,50

Plantes naines et touffues, propres à former un tapis de verdure dans les pentes des rocailles tournées au nord. L'A. europaeum forme de très jolis sous-bois; c'est l'une des meilleures plantes d'ombre. Racines fortement aromatiques.

†	<b>Aselepias</b> Cornuti (pl. mellif.) . . . . .	0,50
---	--	------

V R	— tuberosa . . . . .	0,75
-----	----------------------	------

S Δ	<b>Asparagus</b> acutifolius . . . . .	1,50
-----	--	------

S Δ	— decumbens . . . . .	2,50
-----	-----------------------	------

R	— tenuifolius . . . . .	1,50
---	-------------------------	------

R M	<b>Asperula</b> athoa (suberosa) . . . . .	1,—
-----	--	-----

R	— capitata . . . . .	0,50
---	----------------------	------

R	— ciliata . . . . .	0,50
---	---------------------	------

R S Pr	— cynanchica . . . . .	0,50
--------	------------------------	------

R	— glauca . . . . .	0,50
---	--------------------	------

R	— Gussonei . . . . .	0,50
---	----------------------	------

R	— humifusa . . . . .	1,—
---	----------------------	-----

R	— Neilreichii . . . . .	0,50
---	-------------------------	------

R M	— nitida . . . . .	0,50
-----	--------------------	------

□	— odorata . . . . .	0,50
---	---------------------	------

□	— taurina . . . . .	1,—
---	---------------------	-----

L'A. odorata est une des meilleures plantes pour sous-bois; aromatique, méd.

R V	<b>Asphodeline</b> cretica . . . . .	0,75
-----	--------------------------------------	------

V	— lutea . . . . .	0,50
---	-------------------	------

R V	<b>Asphodelus</b> albus . . . . .	0,50
-----	-----------------------------------	------

R V	— pyrenaicus . . . . .	1,—
-----	------------------------	-----

R	<b>Asterolynosyris</b> Willmottiae . . . . .	1,50
---	--	------



		Fr.
c) <i>Aster Amellus</i> hybrides.		
<b>Aster</b>	Amellus Beauté parfaite, violet foncé . . . . .	0,75
—	» Hermann Löns, compact, bleu pâle . . . . .	0,75
—	» Rotfeuer, rouge foncé . . . . .	0,75
—	» Sonia, rose vif tardif . . . . .	0,75

d) <i>Aster Novae-Angliae</i> .		
<b>Aster</b>	Barr's Pink, 150-180 cm., grandes fleurs carmin vif . . . . .	0,60
—	Constance, 150-180 cm., violet foncé . . . . .	0,60

e) <i>Aster Novae-Belgi</i> .		
<b>Aster</b>	Beauty of Colwall, 120 cm., beau bleu . . . . .	0,60
—	Boule fleurie, 30 cm., petites fleurs rosées . . . . .	0,75
—	Chapurani, 120 cm., bleu lavande, tiges noires, feuilles glauques . . . . .	0,60
—	Ethel Ballard, 80 cm., grandes fleurs rose pâle . . . . .	0,60
—	Glowworm, 80 cm., rouge brillant . . . . .	0,75
—	Little Boy Blue, 60 cm., bleu violet foncé . . . . .	0,75
—	Little Pink Lady, 80 cm., grandes fleurs semi-doubles, rose pur . . . . .	0,60
—	M <sup>me</sup> Charles Weiss, 120 cm., rose vif, semi-double . . . . .	1,—
—	Maid of Athens, 140 cm., grandes panicules roses . . . . .	0,60
—	Nancy Ballard, 80 cm., grandes fleurs rose brillant . . . . .	0,60
—	Queen Mary, 150 cm., grandes fleurs bleues . . . . .	0,60
—	Red Rover, 80 cm., rouge pourpre violet . . . . .	0,75
—	Sam Banham, 150 cm., grandes fleurs blanches . . . . .	0,75
—	St-Egwin, 80 cm., remarquable, rose brillant . . . . .	0,50
—	Sunset, 80 cm., rose carminé . . . . .	0,75

Tous les Asters sont de solides plantes de pleine terre, fleurissant abondamment jusqu'à l'arrière-automne.

## ASTILBES

a) De 60 à 80 cm. (à Fr. 0,75).	
<b>Astilbe</b>	amethyste, pourpre-violacé.
—	astilboides, blanche.
—	Davidii, rose-lilas.
—	Gloria, rose brillant.
—	Granat, rouge brillant.
—	incarnata, rouge.
—	magenta, carmin foncé.
—	Perle rose, rose tendre.
—	Rubin, carmin foncé.
—	Reine des Saumons, rouge saumon.
—	Vesta, lilas rosé.

b) Espèces plus naines (à Fr. 0,75).	
<b>Astilbe</b>	chinensis pumila, rose-lilas.
—	crispa, rose-saumon.
—	grandis, blanche.
—	simplicifolia carnea, rose vif.
—	elegans rosea, rose tendre.
—	Taquetii, rose lilacé.

Ces superbes plantes, fleurissant de juillet à septembre, offrant des hampes de multiples petites fleurs, sont merveilleuses dans les sols humides, au bord des étangs.

R	<b>Astragalus</b>	alopecuroides . . . . .	1,—
R M	—	alpinus (Phaca astragalina) . . . . .	1,50
R M	—	angustifolius . . . . .	0,75
R M	—	aristatus . . . . .	1,—
R M	—	exscapus . . . . .	1,50
R M	—	massiliensis . . . . .	1,—
R M	—	monspessulanus . . . . .	0,75
R	—	Onobrychis . . . . .	1,—
Excellentes plantes pour lieux arides et ensoleillés.			
R O	<b>Astrantia</b>	carniolica . . . . .	1,—
R O	—	carinthiaca . . . . .	1,—
R O	—	gracilis . . . . .	1,—
R O	—	helleborifolia . . . . .	1,50

Fr.

<b>Astrantia (suite)</b>		
R O Pr	— major . . . . .	0,50
R O	— minor . . . . .	0,75
O	<b>Atragene</b> alpina . . . . .	1,50
R	— sibirica . . . . .	1,50
Clématites grimpantes des Alpes, de Chine et de Sibérie de grande valeur et très solides.		
R	<b>Atraphaxis</b> frutescens . . . . .	1,—
R S	<b>Atriplex</b> portulacoides . . . . .	2,50
<b>Aubrietia</b>	Aubrey Prichard, bleu-mauve . . . . .	0,50
—	Blue Gem, bleu . . . . .	0,60
—	cilicica, lilas . . . . .	0,50
—	deltoidea, violet . . . . .	0,50
—	— grdf. . . . .	0,50
—	Fire-King, rouge feu . . . . .	0,75
—	Floraire Crimson . . . . .	0,50
—	Gloire de Vevey, violet-mauve . . . . .	0,50
—	gloriosa, rose . . . . .	0,50
—	Leichtlini Crimson, rose-carmin . . . . .	0,75
—	Lissadell Pink, rose . . . . .	0,50
—	Lloyd Edward, violet-pourpre . . . . .	0,50
—	Marshalli, violet . . . . .	0,50
—	Moehreimi, rose . . . . .	0,50
—	Dr. Mules, violet foncé . . . . .	0,50
—	olympica, lilas pâle . . . . .	0,50
—	Paul's Lilac, lilas-rose . . . . .	0,50
—	Purpur Teppich, pourpre . . . . .	0,60
—	Souvenir W. Ingram, rose . . . . .	0,75
—	Vindictive, rouge . . . . .	0,75

Excellentes plantes pour murailles, fentes des rochers, bordures et talus secs. Indispensables et très précieuses pour l'animation des jardins au printemps. Touffes tapissantes, à innombrables fleurs violettes, roses, lilas, etc.

O Tap	<b>Azalea</b>	procumbens . . . . .	1,50
R	<b>Azorella</b>	trifurcata . . . . .	1,—
R	<b>Ballota</b>	spinosa . . . . .	0,75
R M	<b>Banffya</b>	petraea (Gyps. trans.) . . . . .	0,75
R	<b>Barbarea</b>	rupicola . . . . .	0,50
V	<b>Baptisia</b>	australis . . . . .	0,75



		Fr.
R H	<b>Bellidiastrum</b> Michellii . . . . .	0,50
R	<b>Bellis</b> coerulescens . . . . .	0,50
R	— mexicana . . . . .	0,75
R	— sylvestris . . . . .	1,—
R M	<b>Bellium</b> bellidioides . . . . .	0,50
R M	— minutum . . . . .	0,50
M S	<b>Berardia</b> subacaulis . . . . .	1,50
R	<b>Betonica</b> Alopecuros . . . . .	0,50
P R	— grandiflora . . . . .	0,50
R	— — superba . . . . .	0,60
V	<b>Bidens</b> dahlroides . . . . .	1,—
R	<b>Biscutella</b> laevigata . . . . .	0,75
	— coronopifolia . . . . .	0,75
V	<b>Boltonia</b> latisquama . . . . .	0,50
Haut Aster aux myriades de fleurs roses, septembre-novembre.		
R H	<b>Borago</b> laxiflora . . . . .	1,50
R	— orientalis . . . . .	0,50
R O	<b>Boykinia</b> (voir Saxifrages).	
M	<b>Brassica</b> repanda . . . . .	1,—
P R	<b>Bulbocodium</b> verum . . . . .	0,75
R	<b>Buphtalmum</b> grandiflorum . . . . .	0,50
R N	— speciosissimum . . . . .	1,—
Aq	<b>Butomus</b> umbellatus . . . . .	1,—
	<b>Cacalia</b> , voir Senecio.	
R M	<b>Calamintha</b> Acinos . . . . .	0,50
R M	— alpina . . . . .	0,50
R O	— grandiflora . . . . .	0,50
R S	<b>Calandrinia</b> umbellata . . . . .	0,75
V	<b>Callirhoe</b> involucrata . . . . .	1,—
Aq	<b>Calla</b> palustris . . . . .	1,50
Pal	<b>Caltha</b> palustris . . . . .	0,50
	— — fl. pl. . . . .	0,75
Pal	— polypetala . . . . .	0,75
Plantes croissant dans l'humidité, aux grosses fleurs jaunes.		
V	<b>Calystegia</b> pubescens fl. pl. . . . .	0,50
R	<b>Camassia</b> esculenta . . . . .	0,50

### CAMPANULES

#### a) Rochers et murs.

M	<b>Campanula</b> adsurgens . . . . .	1,—
	— Andrewsii . . . . .	1,—
R M Tap	— Allionii . . . . .	0,60
	— — alba . . . . .	2,50
	— — coerulescens . . . . .	2,50
	— — grandiflora . . . . .	1,—

Cette forme, que nous avons découverte dans les Alpes Maritimes, est extrêmement robuste et florifère et parfois elle prend l'aspect de *C. speciosa*.

R	<b>Campanula</b> alpina . . . . .	1,—
R	— barbata . . . . .	0,75
	— — alba . . . . .	1,50
R	— Barbeyi . . . . .	1,—
R M	— caespitosa . . . . .	1,—
R	— carniolica . . . . .	0,60
R Bo	— carpatica . . . . .	0,50
	— — vars. alba . . . . .	0,60
	— — pelviformis . . . . .	0,60
M Mo	— cenisia . . . . .	1,50
	— collina . . . . .	0,50
	— — var. eriocalyx . . . . .	1,—
R	— coreana (Adenophora) . . . . .	2,50
R M	— Correvoniana . . . . .	1,50
R M	— Cymbalaria . . . . .	1,50
M Mo	— Elatines . . . . .	2,50

		Fr.
<b>Campanula (suite)</b>		
M	— elatinoides . . . . .	1,—
M Mo	— excisa . . . . .	1,25
R M	— fenestrellata . . . . .	1,—
M	— flexuosa . . . . .	1,—
R M	— gargarica . . . . .	0,50
	— — hirsuta . . . . .	0,50

L'une des meilleures pour mur ensoleillé ou ombré.

R	— glomerata acaulis . . . . .	1,—
M	— Kewensis . . . . .	1,—
R M	— linifolia . . . . .	1,50
M	— macrorrhiza . . . . .	1,—
M	— mirabilis . . . . .	1,50
R M	— Miranda (pusilla var.) . . . . .	0,60
R	— nitida . . . . .	0,60
R	— — alba . . . . .	0,75
R	— pelea . . . . .	2,50
M	— petraea (jaune) . . . . .	5,—
R	— pilosa . . . . .	2,50
M	— Piperi . . . . .	2,50
R M	— Porscharskyana . . . . .	0,60
R M	— pulla . . . . .	0,75
R M	— pusilla . . . . .	0,50
	— — alba . . . . .	0,50

Excellente variété pour les murs.

R	— primulaefolia . . . . .	1,50
R M	— Raddeana . . . . .	1,—
M	— Raineri (vraie) . . . . .	1,—
Pr R	— rhomboidalis . . . . .	0,50
R	— rotundifolia . . . . .	0,50
	— — soldanellaeflora . . . . .	1,—
R	— rupestris . . . . .	2,50
R	— sarmatica . . . . .	0,50
M	— Saxifraga . . . . .	1,—
R Mo	— Scheuchzeri . . . . .	1,—
R	— Sophiae . . . . .	2,50
R	— speciosa . . . . .	0,50
M	— stenocodon . . . . .	1,50
R	— thessalica . . . . .	0,50
R M	— thyrsioidea . . . . .	0,50
M	— Tommasiniana . . . . .	1,—
R	— turbinata . . . . .	0,60
R M	— tyrolensis . . . . .	1,—
R	— versicolor . . . . .	0,60
M	— Venzloi . . . . .	1,50
R M	— Waldsteiniana . . . . .	1,50
M	— Wanneri . . . . .	2,50
M	— Wilsonii . . . . .	1,—
M Mo	— Zoisii . . . . .	2,50

b) Campanules des régions inférieures ou des bois, propres à orner la pleine terre ou les grandes rocailles.

<b>Campanula</b> alliariaefolia . . . . .	0,50
— dahurica . . . . .	0,75
— glomerata . . . . .	0,50
— lactiflora . . . . .	0,75
— latifolia . . . . .	0,75
— — alba . . . . .	0,75
— macrantha . . . . .	1,—
— persicifolia . . . . .	0,50
— — grandiflora . . . . .	0,75
— — Moehreimii . . . . .	0,75
— — Telham Beauty . . . . .	0,75
— punctata . . . . .	0,75
— pyramidalis . . . . .	0,50



	Fr.
<b>Campanula (suite)</b>	
— rapunculoides . . . . .	0,50
— Trachelium . . . . .	0,50
La C. pyramidalis est une plante hautement décorative et qui porte, en de longs épis dressés, des myriades de fleurs lilas clair; hauteur de 1 m. à 1 m. 50, suivant la culture; juillet à novembre, soleil, pleine terre, vieux murs, rochers, etc.	
<b>Cardamine macrophylla</b> . . . . .	0,75
— pratensis et fl. pl. . . . .	0,50
□ — trifolia . . . . .	0,75
M S <b>Carduncellus monspeliensium</b> . . . . .	1,50
Pal R <b>Carex baldensis</b> . . . . .	1,—
Pal R — Buchananii . . . . .	1,50
Pal R — plantaginea . . . . .	1,—
Pal R — rupestris . . . . .	0,50
R Pr <b>Carlina acanthifolia</b> . . . . .	0,75
R Pr — acaulis . . . . .	0,50
R — Cynara (Chardon d'or) . . . . .	1,50
Le Chardon d'argent anime à l'automne les pâturages de ses grands capitules bordés de ligules blanches et luisantes; la fleur peut être conservée pour l'hiver. Sol profond; soleil. Les C. acanthifolia et Cynara sont les plus grands, leur capitule mesure jusqu'à 15 cm. de diamètre.	
S <b>Catananche coerulea</b> . . . . .	0,50
△ <b>Cedronella triphylla</b> . . . . .	1,—
V + <b>Centaurea alpina</b> . . . . .	1,50
R — dealbata . . . . .	1,—
R — lugdunensis . . . . .	1,—
V — macrocephala . . . . .	1,50
R O — montana . . . . .	0,50
M S <b>Centranthus angustifolius</b> . . . . .	1,—
— ruber . . . . .	0,50
— vars. alba et atrorubens . . . . .	0,50
L'une des meilleures plantes murales, à fleurs rouge très vif, roses et blanches; il fait merveille sur les rochers arides, dans les vieux murs, sur les talus pierreux, au grand soleil. Fleurit de mai en novembre.	
R <b>Cephalaria alpina</b> . . . . .	0,50
<b>Cerastium argenteum, balcanum, Biebersteinii, carinthiacum (vrai), Columnae, lineare, ovatum, strictum, tomentosum, villosum</b> . . . . .	0,50
Plantes rampantes à feuillage grisâtre, souvent argenté, à très nombreuses fleurs blanches, en étoile; mai-juillet; bonnes pour murs, pentes arides ou bordures.	
R <b>Cheiranthus Allionii</b> . . . . .	0,25
M — Cheirii . . . . .	0,50
V <b>Chelone barbata</b> . . . . .	0,50
C'est l'une des plus brillantes d'entre les plantes vivaces; fleurs rouge vif, de juillet à novembre.	
— — Pink Beauty . . . . .	0,60
— — hybrida . . . . .	0,60
R M <b>Cherleria (Alsine) sedoides</b> . . . . .	0,50
V R <b>Cichorium Intybus roseum</b> . . . . .	1,50
Chicorée sauvage à fleurs rose carné.	

## CHRYSANTHÈMES

### a) de rocailles.

Mo <b>Chrysanthemum alpinum, blanc</b> . . . . .	1,—
R — arcticum, blanc . . . . .	0,60
R — tomentosum, blanc . . . . .	1,—

### b) Chrysanthèmes vivaces de pleine terre.

<b>Chrysanthème</b>	
Bronze Normandie, bronze-or . . . . .	0,75
Champagne, carmin foncé . . . . .	0,75

## Chrysanthème (suite)

Dr Böttcher, brun rouge . . . . .	0,60
Elegante, rose simple . . . . .	0,75
Henry Welker, jaune pâle simple . . . . .	0,75
Jardin des Plantes, blanc rosé . . . . .	0,60
— jaune . . . . .	0,60
M <sup>me</sup> Kesner, énormes fl. jaunes d'or, simples . . . . .	0,75
maximum, grande marguerite blanche . . . . .	0,50
— laciniatum, fl. laciniées . . . . .	0,75
— Mrs. Tersteeg, blanc . . . . .	0,75
Normandie, grandes fleurs roses . . . . .	0,60
Novembersonne, jaune . . . . .	0,75
purpurine, rouge carmin . . . . .	0,60
Ruby, var. naine, pompons rubi . . . . .	0,75
Savoyard, blanc rosé . . . . .	0,50
Source d'or, orange brillant . . . . .	0,75

Les Chrysanthèmes indicum hybrides donnent une grande animation aux jardins pendant l'automne et fleurissent abondamment jusqu'aux gelées.

R <b>Chrysogonum virginianum</b> . . . . .	1,—
R H <b>Chrysosplenium alternifolium</b> . . . . .	1,—
R O <b>Cimicifuga (Actaea) americana, japonica et racemosa</b> . . . . .	1,—
R Mo <b>Cineraria aurantiaca</b> . . . . .	1,—
R Pr <b>Cirsium acaule</b> . . . . .	0,75
□ — Erisithales . . . . .	0,75
△ <b>Cistus formosus</b> . . . . .	1,50
— hirsutus . . . . .	1,50
— ladaniferus . . . . .	1,50
— laurifolius . . . . .	1,50
△ — monspessulanus . . . . .	1,50
— purpureus . . . . .	1,50

Ce sont les délicieuses roses des rochers du Midi; petits arbustes aux fleurs éphémères, mais très élégantes; grand soleil.

V <b>Clematis integrifolia</b> . . . . .	1,—
V — Fremontii . . . . .	1,50
V — Olgae . . . . .	1,50
V R — recta . . . . .	1,—
— — var. atrosanguinea . . . . .	1,50
R — Stans (suavis) . . . . .	1,50
Clématites grimpantes, voir arbustes.	

R S <b>Cneorum tricoccon</b> . . . . .	1,50
R <b>Codonopsis (Glossocomia) clematidea</b> . . . . .	0,50
R <b>Colchicum alpinum et arenarium</b> . . . . .	1,—
Pr — autumnale . . . . .	0,50
R — luteum . . . . .	2,50
<b>Colletia spinosa</b> . . . . .	1,50
M <b>Coluteocarpus reticulatus</b> . . . . .	0,75
Pal <b>Comarum palustre</b> . . . . .	0,50
<b>Convallaria majalis (Muguet)</b> . . . . .	0,25
— grandiflora . . . . .	0,50
— rosea . . . . .	0,50
R △ <b>Convolvulus althaeoides</b> . . . . .	2,50
R S — cantabricus . . . . .	0,50
△ — Cneorum . . . . .	1,50
R S — lineatus . . . . .	1,50
R — nitidus . . . . .	1,—
△ — mauritanicus . . . . .	0,50
R S — Soldanella . . . . .	1,50
V <b>Coreopsis grandiflora, jaune d'or</b> . . . . .	0,50
V — lanceolata, jaune vif . . . . .	0,50
— « Golden Queen » . . . . .	0,60
V — oculata . . . . .	0,50
R — rosea . . . . .	1,—



		Fr.
V R	<b>Coreopsis (suite)</b>	
	— tenuifolia, jaune, centre brun . . . . .	0,50
V	— tripteris . . . . .	0,50
R	<b>Corbularia monophylla</b> . . . . .	1,—
R	— Romieuxii . . . . .	1,—
R S	<b>Coris monspeliensis</b> . . . . .	1,—
R ●	<b>Cornus canadensis</b> . . . . .	1,50
R Tap	<b>Coronilla cappadocica</b> . . . . .	0,50
R	— montana . . . . .	0,50
R O	<b>Cortusa Matthioli</b> . . . . .	1,—
	— — var. major . . . . .	1,50
R O	— pubens . . . . .	1,50
R	<b>Corydalis alba</b> . . . . .	0,60
R M	— australis (solida) . . . . .	0,75
R M	— cheilanthifolia . . . . .	0,50
R M	— lutea . . . . .	0,50
M	— ochroleuca . . . . .	0,75
O □	— tuberosa (cava) . . . . .	0,50
Les espèces tubéreuses fleurissent sous bois, au premier printemps. Les <i>C. cheilanthifolia</i> et <i>lutea</i> sont d'entre les meilleures plantes murales.		
R S	<b>Cossonia africana</b> (voisin de <i>Morisia</i> . . . . .	0,75
R	<b>Cotoneaster</b> (voir arbustes).	
R	<b>Cotula acaenifolia</b> et <i>dioica</i> . . . . .	0,50
	<b>Cotyledon chrysantha</b> , <i>globulariaefolia</i> , <i>libanoticus</i> , <i>oppositifolia</i> , <i>persica</i> , <i>platyphylla</i> , <i>Sempervivum</i> , <i>simplicifolia</i> , <i>spinosa</i> , <i>Pestalozzae</i> . . . . .	1,—
V	<b>Crambe cordifolia</b> . . . . .	2,50
R Mo	<b>Crepis aurea</b> . . . . .	1,—
M Mo	— <i>pygmaea</i> . . . . .	1,50
V	<b>Crinum Powellii</b> et var. <i>album</i> . . . . .	2,50
Lis rose ou blanc très ornemental; culture facile; soleil et si possible un abri léger. Il est superbe à Floraire au pied d'un mur, en plein soleil.		
Pr R	<b>Crocus banaticus</b> , <i>biflorus</i> , <i>corsicus</i> , <i>Imperati</i> , <i>minimus</i> , <i>multifidus</i> , <i>Salzmännii</i> , <i>sativus</i> , <i>Tommasinianus</i> , <i>variabilis</i> , <i>variegatus</i> , <i>versicolor</i> , <i>vernus</i> (violet ou blanc), <i>Weldeni</i> , <i>zonatus</i> . . . . .	0,50
R Bo	<b>Crucianella stylosa</b> . . . . .	0,50
	— — var. <i>carminea</i> . . . . .	0,50
Plantes très solides, tapissantes, formant de belles touffes roses ou carmin.		
Mo	<b>Cyananthus lobatus insignis</b> . . . . .	2,50
Mo	— <i>integer</i> . . . . .	2,50

## CYCLAMENS

## a) Floraison printannière.

R O	<b>Cyclamen abchasicum</b> . . . . .	2,50
R O	— <i>atkinsii</i> . . . . .	1,—
R O	— <i>balearicum</i> . . . . .	2,—
△	— <i>cilicium</i> . . . . .	2,50
R O	— <i>Coum</i> et var. <i>album</i> . . . . .	1,—
R	— <i>ibericum</i> . . . . .	2,50
	— <i>libanoticum</i> . . . . .	2,50
R O	— <i>repandum</i> . . . . .	0,50
Espèce corse très parfumée.		

## b) Floraison automnale.

△	<b>Cyclamen africanum</b> (vrai) . . . . .	5,—
R M	— <i>europaeum</i> . . . . .	0,50

		Fr.
R	<b>Cyclamen (suite)</b>	
	— <i>graecum</i> . . . . .	2,50
	— <i>hederaefolium</i> , voir <i>neapolitanum</i> .	
△	— <i>maritimum</i> . . . . .	5,—
R □	— <i>neapolitanum</i> . . . . .	0,50
	— <i>album</i> . . . . .	1,50
<b>Cypripedium</b> , voir Orchidées.		
<b>Cystopteris</b> , voir Fougères.		
<b>Cytisus</b> , voir arbustes.		
●	<b>Daboecia (Menziesia) polifolia</b> . . . . .	1,50
R M S	<b>Daphne alpina</b> . . . . .	1,50
R	— <i>acutiloba</i> . . . . .	5,—
R	— <i>arbuscula</i> . . . . .	2,—
R O	— <i>Blagayana</i> . . . . .	1,50
R S	— <i>buxifolia</i> ( <i>oleoides</i> ) . . . . .	2,50
R	— <i>Cneorum major</i> . . . . .	1,—
	— <i>albiflora</i> . . . . .	2,50
Cette rare variété a été trouvée par nous au Jura en 1902.		
	— <i>caucasica</i> . . . . .	2,50
△	— <i>collina</i> ( <i>Fioniana</i> ) . . . . .	2,50
S	— <i>glandulosa</i> . . . . .	5,—
R O □	— <i>Laureola</i> . . . . .	1,—
R □	— <i>Mezereum</i> ( <i>Bois Gentil</i> ) . . . . .	1,50
M S	— <i>petraea</i> ( <i>rupestris</i> ) . . . . .	1,50
Nous offrons ici le véritable type, fait de bouture et non greffé.		



Daphne Verlotii

R	<b>Daphne Philippii</b> . . . . .	2,50
R O	— <i>pontica</i> . . . . .	2,50
R	— <i>retusa</i> . . . . .	10,—
R	— <i>Rossetti</i> . . . . .	2,50
R	— <i>sericea</i> . . . . .	2,50



		Fr.
	<b>Daphne (suite)</b>	
R M	— striata . . . . .	2,50
M	— Thauna (petraea X striata) . . . . .	5,—
R M	— Verlotii . . . . .	1,50

### DELPHINIUM (PIEDS D'ALOUETTES)

#### a) Types.

V	<b>Delphinium Bulleyanum</b> . . . . .	1,50
R	— cashmirianum (vrai) . . . . .	1,—
V	— elatum . . . . .	1,—
V +	— formosum . . . . .	1,—
V	— grandiflorum (chinense) . . . . .	0,50
	— — album . . . . .	0,50
R S	— nudicaule . . . . .	1,—
	— tatsuense . . . . .	1,—
R S	— triste . . . . .	1,50

#### b) Delphinium Belladonna hybrides, de 80 cm. à 120 cm.

(Espèces très demandées pour fleurs coupées.)

#### Delphinium

	Andenken an August Koenemann, bleu cobalt brillant, centre blanc . . . . .	1,—
	Arnold Böcklin, bleu gentiane . . . . .	0,80
	Belladonna semi-plenum, bleu-ciel, semi-double . . . . .	1,—
	Berlichingen, indigo clair, œil blanc . . . . .	0,80
	Fellbridge, bleu gentiane . . . . .	0,80
	Persimmon, bleu ciel, simple . . . . .	0,80
	Widukind, grandes fleurs bleu gentiane, centre blanc, très florifère . . . . .	0,80

#### c) Delphinium hybrides, de 130 cm. à 180 cm.

#### Delphinium

	F. Koppius, lilas et bleu clair . . . . .	1,20
	Dusky Monark, semi-double, centre noir . . . . .	1,20
	King of Delphinium, bleu-pourpre foncé, centre blanc . . . . .	1,20
	Rijnlandia, semi-double, beau bleu pur . . . . .	1,20
	Mirabeau, bleu lumineux . . . . .	1,—
	The Alake, bleu-violet, centre rougeâtre . . . . .	1,20
	Van Veen's Triumph, bleu ardoise clair, fleurs immenses . . . . .	1,20

□	<b>Dentaria bulbifera</b> . . . . .	0,50
	— digitata . . . . .	0,50
	— diphylla . . . . .	1,—
	— enneaphylla . . . . .	1,—
	— intermedia . . . . .	1,—
	— laciniata . . . . .	1,50
	— pentaphylla . . . . .	1,50
	— pinnata . . . . .	0,50
	— trifoliata . . . . .	1,50

Belles plantes aux grandes fleurs lilas, blanches ou jaunâtres, pour ombre ou sous-bois.

### DIANTHUS

#### a) Espèces des rochers.

R M	<b>Dianthus acaulis</b> (frigidus) . . . . .	1,—
R Mo	— alpinus (l'un des plus beaux) . . . . .	0,60
	— alpinus vars. albus, atropurpureus . . . . .	2,50
R	— arenarius . . . . .	0,50
R	— aridus . . . . .	1,—
R M Bo	— arvernensis . . . . .	0,50
R	— atrorubens . . . . .	0,50
	— var. splendens . . . . .	0,75

		Fr.
	<b>Dianthus (suite)</b>	
R	— bebius (strictus) . . . . .	1,—
R	— Boissieri . . . . .	1,—
R M	— brachyanthus . . . . .	1,50
R M	— caesioides . . . . .	0,50
R	— Correvonii . . . . .	1,—
R Bo	— corsicus . . . . .	0,50
R	— cretaceus . . . . .	1,50
R Pr	— deltoïdes . . . . .	0,50

Excellent pour tapisser ou former bordure.

	— deltoïdes vars. albus, « Brillant », erectus . . . . .	0,50
	— « Major Sternes », . . . . .	0,75
R	— dentosus . . . . .	0,75
R M	— erinaceus (spinosus) . . . . .	1,50
R	— erythrocoleus . . . . .	1,—
R	— Falconeri . . . . .	0,50
R	— fragrans . . . . .	0,50
R	— Freynii albus . . . . .	1,50
R	— furcatus . . . . .	1,—
R M	— gallicus . . . . .	1,—
R Mo	— glacialis . . . . .	1,—
R Tap	— graniticus . . . . .	0,50
R	— Huteri . . . . .	1,—
R	— illyricus . . . . .	0,75
R	— Kitaibellii . . . . .	1,—
R	— Knappii (fl. jaunes) . . . . .	0,60
R	— Liboschitzianus . . . . .	1,—
R	— lusitanicus . . . . .	1,—
R M	— microlepis . . . . .	1,50
R Tap M	— monspessulanus (l'un des meilleurs) . . . . .	0,50
	— var. carmineus . . . . .	0,75
R M	— Musalae . . . . .	0,75
R	— nardiformis . . . . .	1,—
R Tap M	— neglectus . . . . .	0,50
	— nanus . . . . .	1,50
R	— nitidus . . . . .	1,50
R	— noeanus . . . . .	0,60
R	— pinifolius . . . . .	1,—
R Tap †	— plumarius . . . . .	0,50

Très parfumé, florifère, envahissant rapidement et propre à garnir les talus arides, le sommet des murs, les grands rochers; mai-octobre.

R Bo	— — albus, fl. pl. . . . .	0,50
	— — « cyclope » . . . . .	0,50
	— — roseus, fl. pl. . . . .	0,50
R	— Pontederæ . . . . .	1,—
R	— Pritchardii . . . . .	1,—
R M	— pyridiculus . . . . .	1,50
R M Bo	— Roysii . . . . .	0,50

Variété supérieure au neglectus, grande fleur carmin, de mai en automne.

R	— serratus . . . . .	1,—
R Pr	— speciosus (d'Engadine) . . . . .	0,50
R	— squarrosus . . . . .	1,—
R M	— Sternbergii . . . . .	1,—
R M Tap	— subacaulis . . . . .	0,75
	— var. pygmaeus . . . . .	1,50
R	— sundermannii . . . . .	1,—
B P R	— superbus . . . . .	0,50
R M	— sylvestris . . . . .	0,50
R	— Wimmeri . . . . .	0,75

#### b) Espèces plus élevées.

△	<b>Dianthus arboreus</b> . . . . .	2,50
V +	— barbatus . . . . .	0,50
R	— capitatus . . . . .	0,50



		Fr.
	<b>Dianthus (suite)</b>	
Pr R	— <i>Carthusianorum</i> . . . . .	0,50
R +	— <i>Caryophyllus</i> . . . . .	1,—
R	— <i>cruentus</i> . . . . .	0,50
R	— <i>giganteiformis</i> . . . . .	1,—
R	— <i>Hoeltzeri</i> . . . . .	1,—
R	— <i>pungens</i> , Seguieri et spiculifolius . . . . .	0,60
R	<b>Dicentra</b> <i>Cucullaria</i> , <i>eximia</i> , <i>formosa</i> . . . . .	1,—
Tap R H	<b>Dichondra</b> <i>repens</i> . . . . .	0,50
V R	<b>Dielytra</b> <i>spectabilis</i> . . . . .	1,—
V R S	<b>Dictamnus</b> <i>albus</i> et <i>Fraxinella</i> . . . . .	0,75
R	<b>Digitalis</b> <i>ambigua</i> ( <i>grandiflora</i> ) . . . . .	0,60
R	— <i>ferruginea</i> . . . . .	0,60
R	— <i>laevigata</i> ( <i>jaune</i> et <i>brun</i> ) . . . . .	0,60
R	— <i>lutea</i> . . . . .	0,60
V	— <i>purpurea</i> et <i>var. alba</i> . . . . .	0,60
R	— <i>tomentosa</i> . . . . .	0,60
D. <i>ambigua</i> à grande fleur jaune d'ocre, est précieux pour les rochers (demi-ombre) et la pleine terre; le D. <i>lutea</i> , à petites fleurs jaune paille très nombreuses, réussit n'importe où et fleurit tout l'été. Toutes les Digitales sont de culture facile.		
§	<b>Dioscorea</b> <i>balkanica</i> . . . . .	1,—
R	— <i>pyrenaica</i> . . . . .	1,—
R Bo Δ	<b>Diotis</b> <i>maritima</i> . . . . .	1,—
R	<b>Dipteracanthus</b> <i>strepens</i> . . . . .	1,50
R O	<b>Dodecatheon</b> <i>Clevelandii</i> , <i>integrifolium</i> , <i>redolens</i> . . . . .	1,—
R O	— <i>Meadia</i> . . . . .	0,75
R	<b>Doronicum</b> <i>caucasicum</i> . . . . .	0,50
R V	— <i>excelsum</i> . . . . .	0,50
R	— <i>Pardalianches</i> . . . . .	0,60
Marguerites jaunes apparaissant au printemps; très propres à garnir lieux frais et mi-ombrés; excellentes pour fleurs coupées.		
R S	<b>Doryenium</b> <i>herbaceum</i> et <i>suffruticosum</i> . . . . .	0,75
	<b>DRABA</b>	
	a) Fleurs jaunes.	
R M	<b>Draba</b> <i>aizoides</i> . . . . .	0,50
R M	— <i>armata</i> . . . . .	0,50
R	— <i>Bertolonii</i> . . . . .	0,60
R M	— <i>bruniaefolia</i> . . . . .	0,50
R M	— <i>bryoides</i> . . . . .	0,75
R M	— <i>dicranoides</i> ( <i>rigida</i> ) . . . . .	0,75
R M	— <i>imbricata</i> . . . . .	1,—
R M	— <i>olympica</i> . . . . .	0,60
R	— <i>repens</i> . . . . .	0,50
R M	— <i>scabra</i> . . . . .	1,50
R	— <i>scardica</i> . . . . .	1,—
R	— <i>tridentata</i> . . . . .	1,—
	b) Fleurs blanches.	
R M	<b>Draba</b> <i>Chamaejasme</i> , <i>ciliata</i> , <i>Doerfleri</i> , <i>Gigas</i> , <i>glacialis</i> , <i>hirta</i> , <i>Kotschy</i> , <i>rupestris</i> . . . . .	0,50
	c) Fleurs lilas-rosé.	
R M	<b>Draba</b> ( <i>Petrocallis</i> ) <i>pyrenaica</i> . . . . .	0,75
R	<b>Dracocephalum</b> <i>austriacum</i> , <i>botryoides</i> , <i>Isabellae</i> , <i>japonicum</i> . . . . .	0,60
	— <i>Ruyschianum</i> . . . . .	0,75

		Fr.
R	<b>Dryas</b> <i>Drummondii</i> . . . . .	1,—
R Mo	— <i>integrifolia</i> . . . . .	0,75
R M	— <i>lanata</i> ( <i>nivea</i> , <i>vestita</i> ) . . . . .	0,60
R M Tap	— <i>octopetala</i> . . . . .	0,50
	— <i>minor</i> . . . . .	1,—
R	— <i>Sundermannii</i> . . . . .	0,50
R M	— <i>tenella</i> . . . . .	1,—
Charmantes Rosacées tapissantes, à feuillage élégant et fleurs d'Eglantine.		
R M	<b>Drypis</b> <i>spinosa</i> . . . . .	1,—
R M	<b>Echium</b> <i>petraeum</i> . . . . .	1,—
R	— <i>rubrum</i> . . . . .	1,—
	<b>Edelweiss</b> (voir <i>Leontopodium</i> ).	
	<b>Edraianthus</b> <i>bosniacus</i> . . . . .	1,50
	— <i>caricinus</i> . . . . .	0,75
	— <i>croaticus</i> . . . . .	1,—
	— <i>dalmaticus</i> ( <i>caudatus</i> ) . . . . .	0,75
	— <i>dinaricus</i> . . . . .	1,—
	— <i>graminifolius</i> . . . . .	0,50
	— <i>Kitabellii</i> . . . . .	1,50
	— <i>parnassicus</i> . . . . .	1,—
	— <i>Pumilio</i> . . . . .	1,50
	— <i>serpyllifolius</i> . . . . .	1,—
	— <i>major</i> . . . . .	1,—
	— <i>stenocalyx</i> . . . . .	1,50
	— <i>tenuifolius</i> . . . . .	0,75
Ce sont de gracieuses Campanules des rochers, qui aiment les fentes des murs et des rocaillies au soleil.		
R Mo	<b>Empetrum</b> <i>nigrum</i> . . . . .	1,50
R Mo ●	— <i>scoticum</i> . . . . .	2,50
Pal	<b>Eomecon</b> <i>chionantha</i> . . . . .	1,50
	<b>Ephedra</b> <i>distachya</i> , <i>fragilis</i> , <i>Gerardiana</i> , <i>helvetica</i> , <i>sikkimensis</i> . . . . .	1,50
Propres à envahir les murs et les sols désertiques en plein soleil.		
R †	<b>Epilobium</b> <i>angustifolium</i> ( <i>spicatum</i> ) . . . . .	0,50
Grande plante à épis roses.		
M	— <i>Dodonaei</i> ( <i>Fleischeri</i> ) . . . . .	0,75
R	— <i>Hectori</i> . . . . .	0,50
R M	— <i>rosmarinifolium</i> . . . . .	1,—
	<b>Epimedium</b> <i>alpinum</i> , <i>diphyllum</i> , <i>pinnatum</i> ( <i>colchicum</i> ) . . . . .	0,50
	— <i>hexandrum</i> ( <i>Vancouveria</i> ) . . . . .	1,—
	— <i>niveum</i> , <i>ochroleucum</i> , <i>rubrum</i> , <i>versicolor</i> . . . . .	0,75
Excellentes plantes d'ombre, fleurissant au printemps, et offrant une verdure merveilleuse en hiver.		
R	<b>Equisetum</b> <i>scirpioides</i> . . . . .	1,—
R	<b>Eranthis</b> <i>cilicica</i> . . . . .	0,75
Pr	— <i>hyemalis</i> . . . . .	0,50
R	— <i>Tubergenii</i> . . . . .	0,75
V	<b>Eremostachys</b> <i>laciniata</i> . . . . .	1,50
V	<b>Eremurus</b> <i>himalaicus</i> et <i>robustus</i> . . . . .	2,50
R Tap Bo	<b>Erica</b> <i>carnea</i> . . . . .	0,75
	— <i>vars. alba</i> et <i>hybride</i> . . . . .	1,—
R	— <i>Cecilia</i> <i>Beale</i> . . . . .	1,50
●	— <i>Mackaiana</i> . . . . .	1,50
Δ	— <i>mediterranea</i> . . . . .	1,50
R	— <i>praecox</i> <i>rubra</i> . . . . .	1,50
R	— <i>Springwood</i> . . . . .	1,50
R	— <i>stricta</i> ( <i>corsica</i> ) . . . . .	1,— et 2,50
R	— <i>Vivelli</i> . . . . .	1,50



		Fr.
<b>Erica (suite)</b>		
R ●	— vulgaris (Calluna) . . . .	1,50
R	— Winter Beauty . . . . .	1,50
L'Erica carnea, la plus rustique de toutes, donne de janvier à avril une abondance de fleurs rose carmin; soleil ou mi-ombre; c'est la seule espèce (avec stricta qui forme de beaux buissons fleurissant tout l'été) qui supporte bien le calcaire.		
R	<b>Erigeron alpinus</b> . . . . .	0,60
R	— aurantiacus . . . . .	0,50
	— — hybridus . . . . .	0,50
R	— aureus . . . . .	1,—
R Pr	— bellidifolius . . . . .	0,75
R	— compositus . . . . .	0,50
Tap Bo	— flagellaris . . . . .	0,50
R + Bo	— glabellus . . . . .	0,50
R M †	— mucronatus (Vittadenia). . . . .	0,50
V R	— philadelphicus . . . . .	0,50
V	— « Quakeress » . . . . .	0,60
V	— radiatus . . . . .	0,60
V R +	— speciosus . . . . .	0,50
R	— trifidus et uniflorus . . . . .	0,75
Ce sont de bonnes plantes vivaces ou de rocailles, fleurissant longtemps.		
R M	<b>Erinacea pungens</b> . . . . .	0,75 et 1,50
Genêt à fleur lilas, exigeant le soleil.		
R M	<b>Erinus alpinus</b> . . . . .	0,50
	— — albus . . . . .	0,50
R M	— Dr Hanelle . . . . .	0,75
R M	— hirsutus et var. albus . . . . .	0,50
R M	— hispanicus . . . . .	0,75
Précieuses plantes murales.		
R S	<b>Eriogonum compositum, racemosum, stellatum, subalpinum</b> . . . . .	0,75
R S	— umbellatum . . . . .	0,50
Sp	<b>Eriophorum alpinum</b> . . . . .	1,50
Pal	— angustifolium . . . . .	1,—
R Tap	<b>Eriophyllum caespitosum</b> . . . . .	0,50
M	<b>Eritrichium nanum</b> . . . . .	2,50
Culture plutôt difficile; réussit dans les schistes brisés. Voir volume « Plantes des Montagnes », Correvon.		
R M	<b>Erodium absinthoides (Sibthorpium)</b> . . . . .	0,75
R M	— amanum . . . . .	0,75
R M	— chamaedryoides . . . . .	0,75
R M	— chrysanthum . . . . .	0,50
R M	— corsicum . . . . .	1,50
R M	— Crispii . . . . .	1,—
R M	— daucoïdes . . . . .	0,75
R M	— Guicciardii . . . . .	2,50
R M	— guttatum . . . . .	1,—
R	— hymenodes . . . . .	1,—
R M	— leucanthum . . . . .	1,—
R M	— macradenum . . . . .	0,75
R	— Manescavi . . . . .	0,50
R M	— olympicum . . . . .	0,75
R M	— petraeum . . . . .	1,—
R M	— romanum . . . . .	0,75
R M	— supracanum . . . . .	1,50
R	— Wilkommianum . . . . .	1,50
Excellentes plantes pour murs ou rochers, couleurs variées, longue floraison.		
R V +	<b>Eryngium alpinum</b> . . . . .	0,75
R V +	— amethystinum . . . . .	1,—
R V +	— Bourgatii . . . . .	0,75
R V +	— coeruleum (creticum) . . . . .	1,—

		Fr.
<b>Eryngium (suite)</b>		
V +	— florariense . . . . .	1,50
R +	— giganteum . . . . .	0,50
R +	— maritimum . . . . .	1,50
R V +	— planum . . . . .	0,50
R	— serbicum . . . . .	1,50
R	— Spinalba . . . . .	1,50

Le Panicaud des Alpes (Blue Thistle des Anglais) est une merveille; la collerette en filigrane de teinte bleu violet qui porte le chaton de fleurs est grandement artistique. Toute la partie supérieure de la plante, haute de près d'un mètre, se teinte en bleu violet, pendant plusieurs semaines. Une autre merveille, qui ne devrait manquer dans aucun jardin, est le E. Bourgati des Pyrénées; la plante se revêt en été de bleu et d'améthyste. Le feuillage finement découpé est argenté. Sol calcaire, soleil.



Eryngium Giganteum

R	<b>Erysimum Allionii</b> . . . . .	0,50
R M	— aurantiacum . . . . .	0,50
	— capitatum . . . . .	1,—
R M	— Kotschyannum . . . . .	1,50
R	— linearifolium . . . . .	1,—
R M	— ochroleucum . . . . .	0,50
R	— pachycarpum . . . . .	0,75
R M Tap	— pulchellum . . . . .	0,50
M	— pumilum . . . . .	1,—
R	— purpureum . . . . .	1,—
R	— rupestre . . . . .	0,50
	<b>Erythraea diffusa</b> . . . . .	1,—
R	<b>Erythronium Hartweggii</b> . . . . .	1,—
	— californicum, grandiflorum robustum . . . . .	1,50



		Fr.
	<b>Erythronium (suite)</b>	
Pr	— Dens-canis . . . . .	0,50
	— Hendersonii . . . . .	1,—
	— White Beauty . . . . .	1,—
V	<b>Eupatorium verticillatum</b> . . . . .	1,—
R	<b>Euphorbia capitulata</b> . . . . .	0,60
R	— Characias . . . . .	1,—
R	— Gerardiana . . . . .	1,—
R M †	— Myrsinites . . . . .	0,50
R	— nicaensis . . . . .	0,75
R	— polygalaefolia . . . . .	1,50
R	— pilosa (polychroma) . . . . .	0,75
R	— rigida (biglandulosa) . . . . .	1,—
R M	— spinosa . . . . .	1,—
R	— virgata . . . . .	0,75
R	— Welwitschii . . . . .	0,75
R Tap	<b>Evonymus pygmaea</b> . . . . .	1,—
Δ	<b>Falkia repens</b> . . . . .	1,50
	<b>Farsetia triquetra</b> . . . . .	1,—
R S	<b>Festuca Crinum-ursi et glauca</b> . . . . .	0,50
R †	<b>Fragaria Daltoniana et mono-</b> <b>phylla</b> . . . . .	0,50
Δ	<b>Francoa ramosa</b> . . . . .	1,50
R	<b>Frankenia pulverulenta</b> . . . . .	1,50
R	<b>Fritillaria caussolensis</b> . . . . .	1,—
R Pr	— delphinensis . . . . .	1,—
V	— imperialis . . . . .	1,50
R	— involucrata . . . . .	1,50
R Pr H	— Meleagris . . . . .	0,50
	— var. alba . . . . .	0,50
R	— Moggridgei (fl. jaunes) . . . . .	2,50
R	— tenella . . . . .	1,—
R	<b>Fuchsia gracilis</b> . . . . .	1,50
	<b>Funkia (Hemerocallis ou Hosta)</b>	1,50

Plantes d'ombre, au feuillage large et ornemental, aux fleurs blanc pur et au parfum de lis chez quelques-unes, bleu foncé ou violet chez les autres. Nous possédons une collection de 15 espèces ou variétés.

	<b>Gaillardia colibri nana</b> . . . . .	1,—
	— grandiflora . . . . .	0,50
	— The King . . . . .	0,75

La Gaillarde à grande fleur rouge et jaune fleurit jusque très tard dans l'année.

R Pr	<b>Galanthus nivalis, niv. fl. pl.,</b> <b>praecox, robustus</b> . . . . .	0,50
+	<b>Galatella canescens</b> . . . . .	0,50

Plante vivace pour la fleur coupée et la décoration.

R †	<b>Galeobdolon luteum</b> . . . . .	0,50
R Pr	<b>Galium orientale, purpureum,</b> <b>rubrum, verum</b> . . . . .	0,50
●	<b>Gaultheria procumbens</b> . . . . .	1,50
†	<b>Gaura coccinea</b> . . . . .	1,—
V +	— Lindheimeri . . . . .	0,50
R M Tap	<b>Gentista delphinensis</b> . . . . .	1,—
R Pr	— sagittalis . . . . .	0,50
R M	— triquetra . . . . .	1,50
R M	— Villarsii . . . . .	1,50

Voir en outre aux arbustes.

## GENTIANES

### a) Groupe acaulis.

R Pr	<b>Gentiana acaulis</b> . . . . .	0,50
Ce type renferme cinq espèces parfaitement distinctes.		
R Mo	— alpina . . . . .	1,50



Gentiana alpina

### Gentiana (suite)

R	— angustifolia . . . . .	0,50
La Gentiane angustifolia est la meilleure du groupe, bien supérieure à l'acaulis ordinaire; très stolonifère et même envahissante, elle réussit dans tous les sols pas trop lourds ni trop légers. On en fait des pelouses, des bordures, des tapis, et une garniture excellente sur les rochers; grande fleur en coupe d'un bleu superbe. Fleurit d'avril à juin et souvent de nouveau en automne, parfois même tout l'hiver durant. Mi-ombre.		
R M	— Clusii . . . . .	1,50
R	— dinarica . . . . .	2,50
R	— excisa . . . . .	2,50
R ●	— Kochiana . . . . .	1,—

### b) à grosses racines charnues.

R Pr	<b>Gentiana lutea</b> . . . . .	1,—
R	— pannonica . . . . .	1,50
R	— punctata . . . . .	1,50
R	— purpurea . . . . .	1,50

Il faut à ce groupe un sol profond et pierreux, calcaire pour lutea, une exposition au mi-soleil; ne jamais couper les racines lors du repiquage ou de la transplantation.

### c) Espèces basses et cespitueuses.

R Mo	<b>Gentiana angulosa</b> . . . . .	1,50
T Sp	— bavarica . . . . .	1,50
Mo	— brachyphylla . . . . .	1,50
R	— Farreri . . . . .	1,—
R M	— Favratii . . . . .	1,50
T Mo Sp	— imbricata . . . . .	1,50
R	— Lagodechiana . . . . .	0,60
T Mo Rp	— pyrenaica . . . . .	1,50
Mo Sp	— Rostani . . . . .	2,50



		Fr.
R	<b>Gentiana (suite)</b>	
	— septemfida . . . . .	0,60
	— splendida . . . . .	0,75
Pr R Mo	— verna . . . . .	1,—
	— alba . . . . .	2,50

## d) Espèces des lieux humides.

H Pal O	<b>Gentiana asclepiadea</b> . . . . .	0,75
	— alba . . . . .	0,75
H Pal	— <b>Pneumonanthe</b> . . . . .	1,50

## e) Espèces de culture spéciale.

	<b>Gentiana Freyniana</b> . . . . .	1,50
	— frigida . . . . .	2,50
	— Froelichii . . . . .	1,50

L'une des plus belles et assez facile à cultiver.

	— Makinoi (Japon) . . . . .	2,50
	— Macauleyi . . . . .	2,50
	— Purdomii . . . . .	1,—
	— azurea . . . . .	1,50
	— sino-ornata . . . . .	2,50
	— Veitchiorum . . . . .	2,50

Il leur faut un terrain composé de terreau de feuilles, de sable et tourbe, additionné de cailloux concassés; mi-soleil.

## f) Espèces de culture facile.

	<b>Gentiana altaica</b> . . . . .	1,—
	— cruciata . . . . .	1,—
	— dahurica . . . . .	0,75
	— Fetisowii . . . . .	1,—
	— Kesselringii . . . . .	0,75
	— linearis . . . . .	1,50
	— Olivieri . . . . .	1,—
	— Przewalskii . . . . .	1,50
	— straminea . . . . .	1,—
	— Walujewii . . . . .	1,—

Un bon sol profond et léger leur suffit.

R	<b>Geranium aconitifolium</b> . . . . .	0,50
R	— albanum . . . . .	0,50
R M	— argenteum . . . . .	0,75
	— roseum . . . . .	1,—
V	— armenum . . . . .	1,50
R	— chinense . . . . .	0,75
R M	— cinereum . . . . .	0,75
R	— coeruleum . . . . .	0,50
R	— collinum . . . . .	0,75
R O	— Endressii . . . . .	0,50
R	— Fremontii . . . . .	1,—
R †	— grandiflorum . . . . .	0,75
V	— Gymnocaulon . . . . .	1,—
R	— ibericum . . . . .	0,75
R	— lancastrienne . . . . .	1,—
R Pr	— lividum . . . . .	0,75
R O	— macrorrhizum . . . . .	0,50
R Pal	— nodosum . . . . .	0,50
H	— palustre . . . . .	0,50
Pr □	— phaeum . . . . .	0,50
R	— platypetalum . . . . .	0,75
Pr R +	— pratense . . . . .	0,50
R +	— sanguineum . . . . .	0,50
	— album . . . . .	0,50
	— prostratum . . . . .	1,—
R M	— subcaulescens . . . . .	0,60
R □	— sylvaticum . . . . .	0,50

		Fr.
	<b>Geranium (suite)</b>	
	— sylvaticum roseum . . . . .	0,60
	— Traversii . . . . .	1,—

Excellentes plantes vivaces, pour rocailles, bordures ou sous-bois. Grandes fleurs roses, rouges, mauves, etc.

△	<b>Gerbera Jamesonii</b> . . . . .	1,50
<b>Geum</b>	<b>atrococcineum</b> , rouge-écarlate . . . . .	0,60
	— Borisii, rouge-orange . . . . .	0,60
	— coccineum, couleur de feu . . . . .	0,50
	— — Mrs. J. Bradshaw, rouge brillant . . . . .	0,75
	— florariensis, jaune et brun . . . . .	1,—
	— Heldreichii nain, orange vif . . . . .	0,60
	— — magnificum, très grandes fleurs orangées . . . . .	0,60
	— hybrides :	
	— — Dolly North, grandes fleurs orange vif, reflets carmins . . . . .	0,75
	— — Fire Ball, grandes fleurs orange-rouge . . . . .	0,75
	— — Fire Opal, très grandes fleurs orange-feu, demi-double, fleurit tout l'été . . . . .	0,75
	— — Orange Mann, grandes fleurs orange . . . . .	0,75
	— magellanicum, jaune . . . . .	1,—
	— montanum, jaune . . . . .	0,75
	— — maximum, grande fleur jaune . . . . .	1,—
	— pyrenaicum, jaune . . . . .	0,75
	— reptans, jaune vif . . . . .	1,—
	— rivale, rougeâtre . . . . .	0,50
	— triflorum, rougeâtre . . . . .	0,60
	— Rossii, jaune . . . . .	0,50

Bonnes plantes de rocaille ou de bordure, fleurs oranges, jaunes ou rouges du plus bel effet, longue floraison. Très faciles à cultiver, sauf les types alpins qui demandent un peu plus de soins.

R	<b>Gilia coronopifolia</b> . . . . .	1,—
R V	<b>Gillenia trifoliata</b> . . . . .	0,75
	— stipulacea . . . . .	1,50


Gracieuses Spirées à fleurs blanches, à tiges rouges, très rustiques et florifères.

	<b>Gladiolus byzantinus</b> . . . . .	1,50
	— communis, illyricus, imbricatus, palustris et segetum . . . . .	0,50
R	<b>Glaucium flavum</b> . . . . .	0,60
R	— Burbank's hybrid . . . . .	0,75
△	<b>Globularia Alypum</b> . . . . .	1,50
R M	— bellidifolia . . . . .	0,50
	— — minor . . . . .	0,50
R M	— cordifolia . . . . .	0,50
	— — alba . . . . .	0,60
	— — angustifolia . . . . .	0,75
M	— incanescens . . . . .	1,—
R	— lindavica . . . . .	0,75
R M	— nana . . . . .	0,50
	— — var. pygmaea . . . . .	1,—
R	— nudicaulis . . . . .	0,50
	— — alba . . . . .	0,75
R M	— stygia . . . . .	1,—
R M	— trichosantha . . . . .	0,50
	— — minor . . . . .	0,75
R	— vulgaris . . . . .	0,50

Plantes de soleil et de rochers, généralement tapissantes; mai-juin.



		Fr.
R	<b>Gnaphalium</b> (voir <i>Leontopodium</i> ).	
R	<b>Gutierrezia</b> <i>Sarothrae</i> . . . . .	1,—
V	<b>Gynerium</b> <i>argenteum</i> . . . . .	2,50
R M	<b>Gypsophila</b> <i>alpigena</i> . . . . .	1,—
M	— <i>aretioides</i> . . . . .	0,75
R	— <i>Bungeana</i> . . . . .	1,—
M	— <i>cerastioides</i> . . . . .	0,60
M	— <i>curvifolia</i> . . . . .	1,—
M	— <i>fratensis</i> . . . . .	0,50
V +	— <i>paniculata</i> . . . . .	0,60
	— var. <i>Bristol Fairy</i> . . . . .	1,—
R M	— <i>repens</i> . . . . .	0,50
	— <i>carminea</i> . . . . .	0,60
	— <i>monstrosa</i> . . . . .	0,60
	— « <i>Rosenschleier</i> » . . . . .	0,75
R	— <i>tenuifolia</i> . . . . .	0,75
M	— <i>transilvanica</i> ( <i>Banffy</i> ) . . . . .	0,75
Caryophyllées aux innombrables fleurs blanches ou roses. <i>G. paniculata</i> est une des meilleures plantes à bouquet, et <i>G. repens</i> excellente plante murale et de rocaille se recouvrant tout l'été de fleurs roses.		
M N	<b>Haberlea</b> <i>Ferdinand-Coburgi</i> , <i>rhodopensis</i> . . . . .	2,50
O □	<b>Hacquetia</b> ( <i>Dondia</i> ) <i>Epipactis</i> . . . . .	0,50
R	<b>Haplopappus</b> <i>coronopifolius</i> . . . . .	1,50
R	<b>Hedysarum</b> <i>obscurum</i> . . . . .	1,—
△	<b>Heeria</b> <i>elegans</i> . . . . .	1,—
<b>Helenium</b> <i>autumnale</i> « <i>Gartensonne</i> », jaune d'or, 180 cm. . . . .		
—	— <i>cupreum</i> , rouge cuivre, 180 cm. . . . .	0,60
—	— <i>Bolandieri</i> , jaune d'or, 100 cm. . . . .	0,75
—	— <i>Bolandieri</i> , jaune d'or, 100 cm. . . . .	0,60



Helenium pumilum magnificum

—	<i>Hoopesii</i> , jaune orangé, 80 cm. . . . .	0,60
—	hybr. <i>Moerheim Beauty</i> , rouge feu, 100 cm. . . . .	0,80
—	<i>pumilum magnificum</i> , jaune, 60 cm. . . . .	0,60
R V	<b>Helianthella</b> <i>uniflora</i> . . . . .	1,—

		Fr.
<b>Helianthemum</b> <i>alpestre</i> (jaune), <i>appeninum</i> (blanc), <i>atrosanguineum</i> (carmin), <i>Beauty</i> , brillant (rouge), <i>canum</i> (jaune clair), <i>carneum</i> (rose), <i>coccineum</i> (rouge violent), <i>cocc. fl. doubles</i> , <i>cupreum</i> (cuivre), <i>Fumana</i> (jaune clair), <i>jaune fl. pl.</i> , <i>grandiflorum</i> (jaune vif), <i>lunulatum</i> (jaune ponctué), <i>magnificum</i> , <i>marifolium</i> , <i>mutabile</i> , <i>old gold</i> (jaune d'or), <i>Pritchardii</i> (très beau rose), <i>roseum</i> (rose clair), <i>rosmarinifolium</i> (0,60), <i>rubrum</i> (rouge vif), <i>scardicum</i> (0,75), <i>The Bride</i> (blanc pur), <i>serpyllifolium</i> (jaune), <i>tigrinum</i> (tacheté) . . . . .		
		0,50
Les <i>Helianthèmes</i> ( <i>Rockroses</i> ) sont de petits arbustes couchés, les meilleurs pour garnir les rochers ensoleillés, les pentes arides et sèches, les sols maigres; on en fait des bordures et des tapis. Leurs fleurs sont de petites Eglantines et offrent toutes les teintes en dehors du bleu. Ils ne s'élèvent pas au-dessus de 25 cm. et se couvrent de fleurs de mai à juillet.		

V	<b>Helianthus</b> <i>lactiflorus</i> . . . . .	0,50
V	— <i>multiflorus</i> . . . . .	0,50
R	<b>Helichrysum</b> . . . . .	1,50
R △	— <i>diosmaefolium</i> . . . . .	2,50
M	— <i>frigidum</i> . . . . .	2,50
R S	— <i>Hectori</i> . . . . .	1,50
R S	— <i>Stoechas</i> . . . . .	1,50
V	<b>Heliopsis</b> <i>scabra gratissima</i> . . . . .	0,50
	<b>Helleborus</b> <i>atrorubens</i> , <i>colchicus</i> . . . . .	1,50
	— <i>cupreus</i> . . . . .	2,50
	— <i>foetidus</i> . . . . .	0,50
	— <i>hybridus</i> . . . . .	1,—
	— <i>niger</i> . . . . .	1,50
	— <i>occidentalis</i> . . . . .	1,—
	— <i>orientalis</i> , <i>purpurascens</i> . . . . .	1,50
	— <i>viridis</i> . . . . .	1,—

Sol riche en humus, un peu pierreux; exposition fraîche et mi-ombragée. Éviter de les transplanter souvent.

M N †	<b>Helxine</b> <i>Soleirolii</i> . . . . .	0,50
V	<b>Hemerocallis</b> vrais. . . . .	
	— <i>flava</i> . . . . .	0,75
	— <i>fulva</i> . . . . .	0,75
	— <i>fl. pl.</i> . . . . .	0,75
	— <i>Middendorffii</i> . . . . .	0,75

Sortes de *Lis* jaunes, orangés ou cuivrés, très solides et fleurissant l'été.

	<b>Hepatica</b> , voir <i>Anemone</i> .	
V Mel	<b>Heracleum</b> <i>Mantegazzianum</i> . . . . .	1,

Plante gigantesque que nous avons introduite du Caucase il y a 40 ans; propre à décorer les grands rochers ou à être isolée; elle est très ornementale et demande un sol gras et profond. C'est l'une des meilleures plantes mellifères.

Pr †	<b>Herniaria</b> <i>glabra</i> . . . . .	0,50
M	— <i>hirsuta</i> . . . . .	0,50
V	<b>Hesperis</b> <i>matronalis</i> , fl. pl., lilas ou blanches . . . . .	0,75
R	<b>Heuchera</b> <i>sanguinea</i> . . . . .	0,50
	— <i>alba</i> . . . . .	0,50
	— <i>Pluie de Feu</i> . . . . .	0,60
	— <i>Gerandole</i> . . . . .	0,60
	— <i>Fruhlichii</i> . . . . .	0,60
	— <i>splendens</i> . . . . .	0,50

Hampes de gracieuses petites fleurs rouge vif ou roses. Soleil ou ombre.




		Fr.
V	<b>Hibiscus californicus</b> . . . . .	2,50
	— Mehan's Pink . . . . .	2,50
	— moschatus . . . . .	1,50
	— albus . . . . .	1,50
	— palustris . . . . .	1,50
	— roseus . . . . .	2,50
R Pr M	<b>Hieracium aurantiacum</b> , lanatum, pilosella, stoloniflorum, villosum . . . . .	0,50
R M	<b>Hippocrepis comosa</b> . . . . .	1,—
B O	<b>Homogyne alpina</b> . . . . .	0,50
R	<b>Horminum album</b> . . . . .	1,—
	— pyrenaicum . . . . .	0,50
	— roseum . . . . .	1,—
●	<b>Houstonia longifolia</b> . . . . .	1,50
●	— tenuifolia . . . . .	1,50
Pal	<b>Houttuynia cordata</b> . . . . .	0,50
M N	<b>Hutchinsia alpina</b> . . . . .	0,50
M N	— Auerswaldii . . . . .	0,60
R O	<b>Hylomecon (Stylophorum) vernalis</b> . . . . .	1,50
R	<b>Hyacinthus amethystinus</b> . . . . .	0,50
	— dalmaticus . . . . .	1,—
	— leucophaeus . . . . .	1,—
Med O	<b>Hydrastis canadensis</b> . . . . .	1,50
R Δ	<b>Hypericum aegypticum</b> . . . . .	1,50
R H	— Androsaemum, voir arbustes.	
R	— aureum . . . . .	1,—
□ †	— calycinum . . . . .	0,50
L'une des meilleures plantes pour sous-bois, lieux arides, à l'ombre ou au soleil; envahissante et très solide, beau feuillage et très grandes fleurs jaune brillant.		
S M	— Coris . . . . .	0,75
R	— Gebleri . . . . .	1,—
R	— hyssopifolium . . . . .	1,50
R	— Kotschyanum . . . . .	1,50
R	— lysimachioides . . . . .	1,—
M O	— nummularium . . . . .	0,75
R	— olympicum . . . . .	1,—
R	— orientale . . . . .	0,50
R	— Ptarmicaefolium . . . . .	1,—
R Bo †	— repens . . . . .	0,50
Brillante espèce naine et tapissante, à floraison prolongée.		
R M	— reptans . . . . .	0,75
R	— rhodopensis . . . . .	1,—
R	— Richeri . . . . .	1,—
R	— tomentosum . . . . .	0,50
Ces Hypericum ont des fleurs jaunes, souvent très ornementales; soleil; fleurissent tout l'été. Voir aussi arbustes.		
R S	<b>Hyssopus officinalis</b> . . . . .	0,50
	— vars. albus et ruber . . . . .	0,50
R M	<b>Iberis Garrexiana</b> . . . . .	1,—
R M	— gibraltarica . . . . .	0,50
M	— Jordani . . . . .	0,50
M	— jucunda (aeth. coridif.) . . . . .	1,—
R M Tap	— saxatilis . . . . .	0,50
Fleurit de janvier à juin. Tapis blanc compact.		
R Δ	— semperflorens . . . . .	1,50
R M	— sempervirens . . . . .	0,50
	— vars. Little Gem et Snow Flake . . . . .	0,50
M	— ventosicola (pygmaea) . . . . .	0,75
R O	<b>Imperatoria Ostruthium</b> . . . . .	1,—

		Fr.
R	<b>Incarvillea « Bee's Pink »</b> . . . . .	1,—
R V	— Delavayi . . . . .	0,75
R	— grandiflora . . . . .	0,75
V	— Olgae . . . . .	0,50
R	<b>Inula acaulis</b> . . . . .	1,—
R Bo	— ensifolia . . . . .	0,50
R V	— glandulosa . . . . .	0,75
Med V	— Helenium . . . . .	0,60
Le meilleur remède contre les paresse d'estomac.		
R S	— hirta . . . . .	0,50
R	— montana . . . . .	0,50
V	— Royleana . . . . .	1,—
Les Aunées sont de bonnes plantes de pleine terre; grandes marguerites jaunes fleurissant l'été; soleil.		
H	<b>Iris acoroides</b> . . . . .	1,—
R	— alata . . . . .	0,75
R S	— arenaria . . . . .	1,—
R	— attica . . . . .	1,—
V	— aurea . . . . .	0,50
R	— balcana . . . . .	1,—
R	— bosniaca . . . . .	1,—
R	— Bulleyana . . . . .	1,—
R	— caespitosa (ruthenica) . . . . .	0,60
R	— caucasica . . . . .	1,50
R	— Cengialti . . . . .	1,—
R M	— Chamaeiris . . . . .	0,50
R	— chrysographes . . . . .	2,50
R	— cristata . . . . .	0,60
H	— cuprea (fulva) . . . . .	2,50
	— Danfordiae . . . . .	2,50
R	— Delavayi . . . . .	1,50
V	— ensata . . . . .	0,75
R	— flexicaulis . . . . .	1,50
R V	— florentina . . . . .	0,50
	— type corse . . . . .	1,50
O □	— foetidissima . . . . .	0,50
	— fol. var. . . . .	1,50
R	— Fontanesii . . . . .	1,50
R	— Forrestii . . . . .	1,50
R	— furcata . . . . .	1,—
R V M	— germanica . . . . .	0,50
	— type Valais . . . . .	0,75
Plus de 100 variétés étiquetées dans les meilleurs hybrides des jardins, toutes teintes à		
V	— gigantea . . . . .	0,75
R	— graminea . . . . .	0,75
V	— Guldenstaedtiana . . . . .	1,—
H	— hexagona . . . . .	1,50
	— Lamancei . . . . .	1,50
R S	— Histrio . . . . .	0,75
R S	— histrioides . . . . .	0,75
R	— hungarica . . . . .	1,—
Pal	— Kaempferi . . . . .	1,—
T R	— lacustris . . . . .	1,—
V	— longipetala . . . . .	1,—
R	— Loppio (Cengialti var.) . . . . .	1,—
V	— lurida . . . . .	0,50
R S	— lusitanica . . . . .	1,—
V R	— lutescens . . . . .	0,75
V R	— macrantha . . . . .	1,—
R	— marginata . . . . .	1,—
R	— mellita . . . . .	1,—
R	— missouriensis . . . . .	1,—
R V	— notha . . . . .	1,—
V	— ochroleuca . . . . .	1,—
V	— orientalis . . . . .	1,—



		Fr.
	<b>Iris (suite)</b>	
R S	— orchioïdes . . . . .	1,—
V	— pabularia . . . . .	1,—
V R	— pallida . . . . .	0,50
R	— prismatica . . . . .	1,—
Aq Pal	— Pseudacorus . . . . .	0,50
R M	— pumila (dz. 4,—) . . . . .	0,50
	— — azurea . . . . .	0,50
R	— pyrenaica . . . . .	0,50
S	— Regelio-Cyclus Parthe- nope . . . . .	1,—
S	— — Osiris . . . . .	1,—
S	— reticulata . . . . .	0,50
	— — Hercules . . . . .	0,75
R	— rhaetica . . . . .	1,50
R M	— rubro-marginata . . . . .	2,50
R	— ruthenica . . . . .	0,60
R V	— sambucina . . . . .	1,—
R	— sanguinea (sibir. var.) . . . . .	1,—
R	— setosa . . . . .	2,50
Pal V	— sibirica . . . . .	0,50
	— — vars. alba, McDon- ners . . . . .	0,60
R	— sintenisii . . . . .	1,—
R V	— Sogdiana . . . . .	1,50
V	— spuria . . . . .	0,60
R V	— squalens . . . . .	0,60
R	— stylosa (unguicularis) . . . . .	0,75
	— — cretensis . . . . .	1,—
R	— Talischii . . . . .	1,—
R M	— tectorum . . . . .	1,—
R	— tenax . . . . .	1,—
R	— Thunbergii . . . . .	1,50
R	— Tolmieana . . . . .	1,50
R	— tingitana . . . . .	1,50
S	— tuberosa . . . . .	1,—
R	— Varbosiana . . . . .	1,50
V R	— versicolor . . . . .	1,—
R M	— virescens . . . . .	1,—
V R	— virginica . . . . .	1,—
R	— xiphioides . . . . .	1,—
	<b>Isatis alpina</b> . . . . .	1,—
□	<b>Isopyrum thalictroides</b> . . . . .	0,50
M O	<b>Jankaea Heldreichii</b> . . . . .	10,—
R	<b>Jasione perennis</b> . . . . .	0,75
O	<b>Jeffersonia diphylla</b> . . . . .	1,50
	— pinnata . . . . .	2,50
Pal	<b>Juncus arcticus</b> . . . . .	1,—
Pal	— zebrinus . . . . .	1,—
M	<b>Kernera saxatilis</b> . . . . .	0,50
O	<b>Kirengeshoma palmata</b> . . . . .	1,50
V	<b>Kniphofia aloides</b> (Tritoma Uva- ria) . . . . .	1,—
V	— caulescens . . . . .	1,50
V	— « Express » . . . . .	1,—
V	— grandiflora . . . . .	1,—
V	— Macowanii . . . . .	1,—
V	— nathaliensis . . . . .	1,—
V	— Nelsoni . . . . .	1,50
R S	<b>Lactuca perennis</b> . . . . .	1,—
R O	<b>Lamium Orvala</b> . . . . .	0,75
§	<b>Lathyrus grandiflorus</b> . . . . .	0,75
§	— latifolius . . . . .	0,75
	— — vars. albus et roseus . . . . .	0,75
§	— rotundifolius . . . . .	0,75
†	<b>Laurentia tenella</b> . . . . .	1,50

		Fr.
R S	<b>Lavandula delphinensis</b> . . . . .	1,—
R S	— Spica (latifolia) . . . . .	0,50
	— — alba . . . . .	1,—
R S	— officinalis (vera) . . . . .	0,50
R S	— — compacta . . . . .	0,75
R	— pyrenaica . . . . .	1,50
Δ	— Stoeckas . . . . .	1,—
	<b>Leontopodium alpinum</b> (Edel- weiss) . . . . .	0,50
La culture de l'Etoile d'argent est facile : Soleil, rochers ou plates-bandes, tenir sec en hiver; diviser la touffe tous les deux ans. Pour avoir la fleur très blanche, il faut mettre du calcaire dans le sol.		
	— vars. calocephalum . . . . .	1,—
	<b>Leucanthemum</b> , voir Chrysan- themum.	
R	<b>Leucojum aestivum</b> . . . . .	0,50
R	— nicaense (hiemale) . . . . .	1,—
R Δ	— longifolium . . . . .	1,50
R	— pulchellum . . . . .	1,50
R	— roseum . . . . .	1,—
Pr □	— vernum . . . . .	0,50
R S	<b>Leuzea conifera</b> . . . . .	1,50
R S	<b>Lewisia Cotyledon</b> . . . . .	1,50
	— columbiana et rediviva . . . . .	1,50
V	<b>Liatris scariosa</b> . . . . .	0,50
V	— spicata . . . . .	1,—
	<b>Libertia grandiflora</b> . . . . .	1,—
R	<b>Lilium albanicum</b> . . . . .	5,—
	— auratum . . . . .	2,50




Lilium regale

R	— bulbiferum . . . . .	1,—
R S	— candidum . . . . .	1,—
R	— carniolicum . . . . .	2,50



		Fr.
	<b>Lilium (suite)</b>	
R	— Chaixii . . . . .	1,50
V R	— chalconicum . . . . .	5,—
V R	— croceum . . . . .	1,—
	— Hansonii . . . . .	2,50
	— Henryi . . . . .	2,50
R	— Jankae . . . . .	2,50
O □	— Martagon . . . . .	0,50
R S V	— pomponium . . . . .	1,50
Martagon rouge vif, l'un des plus beaux et plus solides.		
O □	— pyrenaicum (Martagon jaune) . . . . .	1,50
V	— regale . . . . .	1,—
V	— sulphurgale . . . . .	1,—
R M	<b>Linaria alpina</b> . . . . .	0,50
	— — rosea (dz. 4,—) . . . . .	0,50
M O †	— Cymbalaria (Ruine de Rome) . . . . .	0,50
	— — alba . . . . .	0,50
M	— hepaticaefolia . . . . .	1,—
M	— origanifolia . . . . .	0,50
M †	— pallida . . . . .	0,50
	— — alba . . . . .	0,60
M	— pilosa . . . . .	1,—
R	— purpurea . . . . .	1,—
M	— tristis . . . . .	0,50
V R	<b>Lindelia spectabilis</b> . . . . .	0,75
O Tap □	<b>Linnaea borealis</b> . . . . .	1,50
O Tap □	— canadensis . . . . .	2,50
R S	<b>Linosyris vulgaris</b> . . . . .	0,50
R M	<b>Linum alpinum</b> . . . . .	0,50
R S	— arboreum, jaune . . . . .	0,75
R	— austriacum . . . . .	0,50
R S	— campanulatum, jaune . . . . .	0,50
R S	— capitatum . . . . .	1,—
R	— collinum . . . . .	1,50
R S	— elegans . . . . .	1,50
R	— glabrescens . . . . .	1,50
	— glandulosum . . . . .	1,—
	— heterocarpum . . . . .	1,—
R S	— hirsutum . . . . .	0,75
R S	— hypericifolium . . . . .	1,50
R S	— iberideum . . . . .	1,50
V R	— narbonense, bleu . . . . .	0,50
R S	— orientale, jaune . . . . .	1,—
Pr V R	— perenne, bleu . . . . .	0,50
Pr V R	— — album . . . . .	0,50
R S	— salsoloides . . . . .	0,75
M	— tenuifolium . . . . .	0,50
R	— Tommasinii . . . . .	1,—
R	— viscosum . . . . .	1,—
Les lins sont d'excellentes plantes vivaces et de rocaille, fleurissant en juin et juillet.		
Les L. alpinum, perenne et narbonense fournissent une grande quantité de fleurs bleues, gracieusement supportées par de fines tiges.		
R Tap	<b>Lippia canescens et nodiflora</b> . . . . .	0,50
R S	<b>Lithospermum canescens (orange)</b> . . . . .	5,—
	— Doerfleri . . . . .	1,50
R	— Froebellii . . . . .	1,—
R Δ	— fruticosum . . . . .	1,50
R M	— Gastonii . . . . .	2,50
R M	— graminifolium . . . . .	0,60
R M	— intermedium . . . . .	0,60
M	— oleoides . . . . .	1,50
R M	— petraeum (Echium) . . . . .	1,—

		Fr.
	<b>Linum (suite)</b>	
R ●	— prostratum . . . . .	1,—
	— — album . . . . .	2,50
	— — major . . . . .	2,50
O R □	— purpureo-coeruleum . . . . .	0,50
R Δ	— rosmarinifolium . . . . .	1,50
R	— Zollingeri . . . . .	1,—
Ce sont des plantes de grand soleil, pour talus secs ou murs, à fleurs généralement bleues.		
Sp Mo	<b>Lloydia alpina (serotina)</b> . . . . .	1,50
H	<b>Lobelia cardinalis type</b> . . . . .	1,—
H	— syphilitica et var. alba . . . . .	0,50
Pr R	<b>Lotus corniculatus</b> . . . . .	0,50
O	<b>Lunaria rediviva</b> . . . . .	0,75
V +	<b>Lupinus polyphyllus variés</b> . . . . .	0,60
	— « Tangerine » . . . . .	0,75



Lupinus poliphyllus

O	<b>Luzula albida, cuprina, maxima</b> . . . . .	
	varieg., lutea, nivea . . . . .	0,60
R	<b>Lychnis alpina et var. alba</b> . . . . .	0,50
V	— chalconica . . . . .	0,50
	— — vars. alba et carnea . . . . .	1,—
R Pr	— Flos Jovis . . . . .	0,50
R	— Haageana . . . . .	1,—
M	— Lagascae . . . . .	0,75
R	— lapponica . . . . .	0,50
R V Pr	— Viscaria . . . . .	0,50
	— — splendens . . . . .	0,60
Brillante variété carmin vif.		
H	<b>Lysimachia ciliata</b> . . . . .	1,—
V	— clethroides . . . . .	0,60
Pal R	— Ephemerum . . . . .	1,—
□ Tap	— nemorum . . . . .	0,50



		Fr.
<b>Lysimachia (suite)</b>		
Pal Tap	— Nummularia . . . . .	0,50
	— aurea . . . . .	0,75
V R	— punctata . . . . .	0,50
Pal	— thyrsoflora . . . . .	0,75
V H †	— verticillata (punctata) .	0,50
Pal †	— vulgaris . . . . .	0,50
L. Nummularia est l'une des meilleures plantes tapissantes et retombantes; au cœur de Londres on la voit retomber des fenêtres et se couvrir de fleurs jaune brillant. Plante solide pour les lieux humides et ombragés. Toutes les Lysimachies aiment l'humidité.		
Pal	<b>Lysichiton</b> kamtchatkense . .	2,—
Pal	<b>Lythrum</b> Salicaria . . . . .	0,50
Pal	<b>Malachium</b> aquaticum . . . .	1,—
R	<b>Malva</b> moschata . . . . .	0,50
	— alba . . . . .	0,50
R	<b>Malvastrum</b> coccineum . . . .	1,50
R Med	<b>Mandragora</b> officinalis . . . .	2,50
R	<b>Margyricarpus</b> setosus . . . .	1,—
R S	<b>Marrubium</b> candidissimum, cyl-leneum, libanoticum, sericeum et velutinum . . . . .	0,50
Plantes à feuillage gris-argenté.		
M †	<b>Matthiola</b> pedemontana, sinua-ta, tristis, valesiaca et varia . . . . .	1,50
Giroflées vivaces envahissant rapidement les murs et rochers calcaires; soleil.		
O † □	<b>Maianthemum</b> bifolium . . . .	0,50
O ●	<b>Meconopsis</b> Bayleyi (betonici-folia) . . . . .	1,—
Ce Pavot d'un bleu intense, très rustique, est l'une des meilleures introductions de ces dernières années.		
O □	— cambrica . . . . .	0,50
	— aurantiaca . . . . .	0,50
	— fl. pl. . . . .	1,50
O	— (Stylophorum) petiolata . . .	1,—
O ●	— Wallichii . . . . .	1,50
	<b>Megasea</b> , voir Saxifraga.	
Med Arom	<b>Melissa</b> officinalis . . . . .	0,50
□ R	<b>Melittis</b> Melissophyllum . . . .	0,60
	— var. atroroseum . . . . .	0,75
Arom Med	<b>Mentha</b> citrata (gentilis), cris-pa, piperita (Menthe poivrée) .	0,50
Les Menthes sont très appréciées comme condi-ment par les Anglais et comme remède par tout le monde.		
M N △	— Requiemi (Thymus corsi-cus) . . . . .	0,50
Aq	<b>Menyanthes</b> trifoliata (Trèfle d'eau) . . . . .	0,50
R Pr	<b>Merendera</b> Bulbocodium . . . .	0,50
	(Voir en outre Romulea.)	
R	<b>Mertensia</b> lanceolata . . . . .	1,—
R	— paniculata . . . . .	1,—
R	— sibirica . . . . .	1,50
R O	— virginica . . . . .	1,—
R Med	<b>Meum</b> athamanticum . . . . .	1,—
R Tap	<b>Micromeria</b> Douglasii . . . . .	1,—
Plante aromatique, nommée « Reine des Reines », à croissance rapide tapissant le sol.		
R	— croatica . . . . .	0,50
R Arom	— microphylla . . . . .	1,—
M R S	— Piperella . . . . .	1,50
M	— pygmaea . . . . .	1,50
R Arom	— rupestris . . . . .	1,—
Petites Labiées pour rochers ensoleillés; aroma-tiques et florifères.		

		Fr.
H	<b>Mimulus</b> cardinalis . . . . .	0,50
T	— Lewisii . . . . .	1,—
H	— luteus . . . . .	0,50
T R	— moschatus . . . . .	0,50
	— ringens . . . . .	0,75
<b>Minuartia</b> (voir Arenaria)		
O M	<b>Moehringia</b> muscosa . . . . .	0,50
M R	— pendula . . . . .	0,75
M	— polygonoides . . . . .	1,—
V +	<b>Monarda</b> didyma (Melisse d'or) .	0,60
	— Cambridge Scarlet . . . . .	0,75
	— alba . . . . .	1,—
V +	— florariensis (rose tendre) .	0,60
V +	— superba . . . . .	0,75
V +	— violacea . . . . .	0,75
Belles plantes vivaces à fleurs élégantes et à feuillage odorant; juillet-octobre. M. didyma, d'un rouge vermillon velouté, très brillant. Plantes solides préférant un sol frais.		
R	<b>Morina</b> longifolia . . . . .	0,75
R M	<b>Morisia</b> hypogaea . . . . .	1,—
Tap	<b>Muehlenbeckia</b> axillaris . . . .	1,—
Arbustes trainants à petites feuilles.		
	<b>Mulgedium</b> alpinum . . . . .	1,—
	— Bourgaei . . . . .	0,75
	— Plumieri . . . . .	1,—
Grandes laitues aux fleurs bleu-violet, en grappes ou panicules plus ou moins étalés. Très décoratives pour ombre, sous-bois, etc. Juillet-octobre.		
R	<b>Muscari</b> comosum, neglectum et racemosum . . . . .	0,50
R	— moschatum et plumosum . . .	0,75
R Pr	<b>Myosotis</b> alpestris . . . . .	0,50
R	— caespitosa . . . . .	1,—
R	— lithospermifolia . . . . .	1,—
Pal	— palustris semperflorens . . .	0,60
Pal	— Rehsteineri . . . . .	1,—
R	— rupicola (pyrenaica) . . . .	1,—
O □	<b>Myrrhis</b> odorata (Myrrhe) . . .	1,—
R	<b>Narcissus</b> biflorus . . . . .	0,50
R	— Bulbocodium . . . . .	1,—
R	— capax . . . . .	1,—
R	— juncifolius . . . . .	0,50
R	— Jonquilla . . . . .	1,—
R	— moschatus . . . . .	1,—
C'est la rare Jonquille espagnole à fleur blanche.		
R	— muticus (Pyrénées) . . . .	1,—
R Pr	— poeticus (de Montreux) . . .	0,50
R Pr	— Pseudo-Narcissus . . . . .	0,50
R Pr	— radiiflorus . . . . .	0,50
R Bo	<b>Nepeta</b> Mussinii . . . . .	0,50
R	— nervosa . . . . .	0,60
H △	<b>Nierembergia</b> rivularis . . . .	0,50
R S	— hippomanica . . . . .	1,50
(nouveau !)		
	<b>Nigritella</b> , voir Orchidées.	
R	<b>Nothoscordium</b> fragrans . . . .	0,50
Aq	<b>Nuphar</b> luteum . . . . .	1,50
Aq	<b>Nymphaea</b> alba . . . . .	1,50
	— chromatella . . . . .	2,50
Variétés de Nénuphars à fleurs roses, carmin, jaunes, rosées, etc. à 2,50.		
	<b>Œillet</b> (voir aussi Dianthus).	
	— Flon rose . . . . .	0,75
	— Souvenir de la Malmaison . .	2,50
R T	<b>Oenothera</b> caespitosa . . . . .	1,—
R	— Fraseri . . . . .	0,50



	Fr.
<b>Oenothera (suite)</b>	
R T — marginata . . . . .	1,—
R Bo — missouriensis (macrocarpa) . . . . .	0,50
R — pumila . . . . .	1,—
R — rosea mexicana . . . . .	1,—
R — serrulata . . . . .	1,—
V † — speciosa . . . . .	0,50
Excellentes plantes vivaces et de rochers. O. missouriensis est une bonne plante rampante à grande fleur jaune clair; mai-novembre.	
O — <b>Omphalodes cappadocica</b> . . . . .	0,75
R — nitida (lusitanica) . . . . .	1,—
O □ — verna et var. alba . . . . .	0,50
R M — <b>Ononis cenisia</b> . . . . .	1,50
R — fruticosa . . . . .	1,50
Délicieux petit arbuste à fleurs roses et carmin.	
R — Natrix, jaune . . . . .	1,—
R — rotundifolia . . . . .	1,50
R M — spinosa . . . . .	1,—
R — <b>Onosma albo-roseum</b> . . . . .	1,50
M — helveticum . . . . .	1,50
R S — nanum . . . . .	1,—
R S — rupestre . . . . .	1,50
R S — Ruyschianum (rose) . . . . .	2,50
R S — stellulatum . . . . .	0,75
R S — tauricum . . . . .	1,—
M — Visianii . . . . .	1,50

Résistent aux endroits les plus secs. Clochettes jaunes, crème ou rosées.

<b>Opuntia arborescens</b> . . . . .	2,50
— cantabrigensis . . . . .	2,50
— Rafinesquii . . . . .	1,—
— rhodantha . . . . .	1,50
— vaseyi magenta . . . . .	2,50
— vulgaris . . . . .	0,50
— Xanthostemma . . . . .	2,50

Ces Cactées du Nord américain sont fort intéressantes. Elles résistent à notre climat, à condition d'être placées au soleil, dans un sol bien drainé.

**Ophrys et Orchis**, voir Orchidées.

	Fr.
Arom M — <b>Origanum pulchrum</b> . . . . .	1,—
M R — sipyleum (hybridum) . . . . .	1,—
— <b>Ornithogalum narbonense</b> , pyramidale, pyrenaicum . . . . .	0,50
— divergens . . . . .	1,—
— sulphureum . . . . .	1,—
— tenuifolium . . . . .	1,50
— umbellatum . . . . .	1,—
□ — <b>Orobis niger</b> . . . . .	0,50
□ — vernus . . . . .	0,50
Excellentes plantes pour sous-bois; avril-mai.	
— var. albus et roseus . . . . .	1,50
R S V — <b>Ostrowskia magnifica</b> . . . . .	1,50
R S — <b>Othonnopsis cheirifolia</b> . . . . .	0,60
□ — <b>Oxalis Acetosella</b> . . . . .	0,50
R † — atrosanguinea . . . . .	0,50
M — <b>Oxytropis campestris</b> . . . . .	1,50
M — Halleri . . . . .	1,50
M — montana . . . . .	1,50
M — pilosa . . . . .	1,50
O — <b>Pachysandra axillaris</b> . . . . .	0,50
O — procumbens . . . . .	0,50
O † — terminalis . . . . .	0,50
— fol. var. . . . .	0,50
M N — <b>Paederota Ageria et Bonarota</b> . . . . .	1,50

## PAEONIA (PIVOINES)

### a) Types.

<b>Paeonia albiflora</b> . . . . .	2,50	<b>Emodi</b> . . . . .	2,00
<b>Bakeri</b> . . . . .	2,50	<b>lutea</b> . . . . .	1,50
<b>Berezowskii</b> . . . . .	2,50	<b>Mlokosiewskii</b> . . . . .	2,50
<b>chamaeleon</b> . . . . .		<b>obovata</b> . . . . .	2,50
(Mlokos. X		<b>officinalis</b> . . . . .	1,50
Witmann) . . . . .	2,50	<b>paradoxa</b> . . . . .	2,50
<b>corallina</b> . . . . .	1,50	<b>peregrina</b> . . . . .	2,50
<b>coriacea</b> . . . . .	2,50	<b>tenuifolia</b> . . . . .	1,50
<b>decora (romani-</b>		— vars. fl. pl. . . . .	1,50
<b>ca)</b> . . . . .	1,50	<b>Veitchii</b> . . . . .	2,50
<b>Delavayi</b> . . . . .	2,50	<b>Wittmanniana</b> . . . . .	2,50
— alba . . . . .	2,50		

### b) Pivoines de Chine hybrides.

<b>Albâtre, blanc pur</b> . . . . .	1,50
<b>Beauté française, beau rose</b> . . . . .	1,80
<b>Duc de Wellington, blanc soufré</b> . . . . .	1,80
<b>Duchâtre, rose tendre, centre jaunâtre</b> . . . . .	1,80
<b>Linné, rose foncé</b> . . . . .	2,—
<b>M<sup>me</sup> de Galhau, rose carné</b> . . . . .	1,80
<b>M<sup>me</sup> Forel, grandes fleurs, reflets argentés</b> . . . . .	1,50
<b>Marguerite Gérard, grandes fleurs chair, centre blanc</b> . . . . .	1,80
<b>Meissonnier, rouge pourpre</b> . . . . .	1,80
<b>rosea superbissima, rose clair</b> . . . . .	2,—
<b>rubra Triomphe, pourpre cramoisi, semi-double</b> . . . . .	2,—
<b>Solfatara, collerette blanche, centre jaune soufre</b> . . . . .	1,80

Nous offrons en outre une centaine de variétés de 1 fr. 50 à 2 francs.


### c) Pivoines en arbres.

<b>Professeur Maxime Cornu, énormes fleurs jaunes et carmin</b> . . . . .	6,— à 10,—
<b>Reine Elisabeth, grandes fleurs carmin</b> . . . . .	2,50 à 5,—
<b>Jeanne d'Arc, rose tendre</b> . . . . .	2,50 à 5,—
<b>Reine des Violettes, énormes fleurs violet foncé</b> . . . . .	7,50 à 12,—
<b>lactea, blanc pur</b> . . . . .	3,— à 5,—
<b>Comtesse de Tuder, saumon vif</b> . . . . .	3,— à 5,—
<b>Grand-Duc de Bade, violet lilacé</b> . . . . .	3,— à 5,—
<b>Ranieri, rouge pourpre carminé</b> . . . . .	3,— à 5,—
<b>Ville de Saint-Denis, blanc teinté de rose</b> . . . . .	3,— à 5,—







*Phyteuma comosum*



*Pivoina*, Prof. M. Cornu



*Papaver alpinum*



*Platycodon mariesi*



**Paeonia (suite)**

M <sup>me</sup> de Vatry, rosé et carminé	3,— à	5,—
Georges Paul, très grandes fleurs violet Evêque		5,—
atrosanguinea, rouge foncé		5,—
Gloria Belgarum, cerise nuancé carmin	3,— à	5,—
M. A. Jullien, rose saumon		5,—

**d) Pivoines en arbres japonaises.**

Daikagura, rose carminé violacé	5,— à	10,—
Ahasii Hishiki, rouge		10,—
Yaso Okuna, énormes fleurs blanches		10,—
Aya Hishiki		10,—
Kumona Hishiki		10,—
Kaguraguna		10,—
Sawii		10,—
Sawa-no-Taki		10,—
Beauté de Tokio, violet-pourpre	5,— à	10,—

Les pivoines sont merveilleuses en massifs ou pour être isolées au milieu de pelouses. Leurs grandes et belles fleurs, aux teintes infinies, font qu'elles sont très appréciées dans tous les jardins, ou comme fleurs coupées.

**PAPAVER (PAVOTS)**

Fr.

**a) Alps et types.**

M R	<b>Papaver alpinum</b> type	0,50
	— vars. de diverses couleurs	0,50
	— altaicum	1,—

R **Papaver nudicaule** . . . . . 0,50  
Le Pavot d'Islande bien connu, l'une des meilleures plantes des rochers, surtout à la montagne.

M	— pyrenaicum et rhaeticum	0,75
R	— rupifragum	0,50
R	— triniaefolium	1,—

**b) Papaver orientale hybrides.**

<b>Papaver bracteatum</b> (involucratum), fleurs immenses, rouge foncé à centre noir	1,—
— Colonel Bowles, rouge, tardif	0,75
— Fimbriata, nain, orange pâle, pétales laciniés	0,75
— Joyce, rose cramoi, fleurs énormes, l'un des plus beaux	1,—
— King George, rouge écarlate, pétales laciniés	0,75
— Mahony, rouge-brun très foncé	0,75
— Mrs. Stobart, rose cerise brillant	1,—
— Orange King, rouge écarlate	0,60
— Princesse Victoria-Louise, très grandes fleurs rose saumon	0,60
— Sturmfackel, rouge feu	1,—
— Wunderkind, rose cramoi, grandes fleurs	0,75

Nous ne saurions trop recommander les Pavots d'Orient, ces magnifiques plantes d'ornement, de culture très facile, s'élevant de 50 cm. à 100 cm. Excellentes pour fleurs coupées et bordure vivace.

Fr.

R	<b>Paradisea</b> (Anthericum) Liliago	0,50
R Pr	— Liliastrium	0,50
	— major	1,—
□	<b>Paris</b> quadrifolia	1,—
T	<b>Parnassia</b> palustris	0,75
△	<b>Parochetus</b> communis (Fleur des dieux)	0,75

C'est un pois vivace, rampant, à fleur bleu de Gentiane.

M †	<b>Paronychia</b> argentea, capitata, Kapela, macrosepala et serpyllifolia	0,50
-----	--	------

Excellentes plantes tapissantes.

R	<b>Passerina</b> nivalis	1,50
R	<b>Patrinia</b> palmata	0,75
R M	<b>Peganum</b> Harmala	1,50
Aq	<b>Peltandra</b> virginica	1,50
R S	<b>Pentstemon</b> Barretae	1,50
V	— « Blue Gem »	1,50
V	— Bridgesii	1,—
V	— centranthiflorus	1,—
V T +	— Cobaea	1,—
R	— coeruleus	1,—

**Pentstemon (suite)**

V	— cordifolius	1,—
R	— confertus coeruleo-purpureus	0,75
V	— Crimson Bedder	0,75
R	— glaber v. alpinus	0,75
R	— grandiflorus	0,75
R +	— heterophyllus, bleu intense	1,—
R	— humilis	0,75
R M	— linarioides	0,75
R	— Menziesii	1,—
V	— neomexicanus	0,75
V +	— Newbury Gem	0,75
V	— ovatus	0,50
V	— Pink Bedder	0,75
V R +	— pubescens	0,50
V	— « Scarlet »	0,75
R	— pygmaeus	1,—
R	— richardsoni	0,75
R +	— Scouleri	1,—
V +	— unilateralis	1,—
V	— venustus	0,75

Une ou deux variétés doivent être protégées chez nous l'hiver.



		Fr.
Arom S+	<b>Perowskia atriplicifolia</b> . . . . .	2,50
Excellente plante arbustive à forte odeur d'Eucalyptus; grands épis de Lavande bleu foncé; de juillet à novembre; feuillage argenté. Plante très décorative. Grand soleil.		
	— abrotanifolia . . . . .	2,50
O □	<b>Petasites albus et niveus</b> . . . . .	0,50
	— fragrans (Héliotrope d'hiver) . . . . .	0,50
Donne tout l'hiver des thyrses de fleurs lilas à parfum d'héliotrope. Situation ombragée et abritée.		
V △	<b>Phlomis fruticosa</b> . . . . .	1,—
V	— Herba-Venti . . . . .	1,—
V +	— samia . . . . .	0,50

## PHLOX

### a) Nains pour rocaille.

R Tap	<b>Phlox amoena</b> . . . . .	0,50
R Tap	— divaricata (canadensis) . . . . .	0,50
R M	— Douglasii . . . . .	0,50
	— var. hybrida . . . . .	0,60
R	— purpurea . . . . .	0,50
R M Bo	— setacea . . . . .	0,50
R	— stolonifera . . . . .	0,75
R Tap	— subulata et vars.: amabilis, atropurpurea, Camla, Daisy Hill, Mayschnee, nivalis, Sprite, The Bride, Vivid, G. F. Wilson . . . . .	0,50

### b) Phlox hybrides, floraison juillet à septembre (de 40 à 100 cm.).

		Fr.
<b>Phlox</b>	Adorno, rouge orangé brillant, œil foncé . . . . .	0,60
—	Amaranthe . . . . .	0,60
—	America, rose . . . . .	0,50
—	Caroline Van den Berg, grandes fleurs d'un bleu clair . . . . .	0,75
—	Deutschland, rouge orangé . . . . .	0,75
—	Elisabeth Campbell, rose saumon tendre . . . . .	0,60
—	Erntefeuer, tardif, grands panicules de fleurs orange saumoné . . . . .	1,—
—	Etoile de feu (syn. Général von Heutz), rouge saumon, œil blanc . . . . .	0,50
—	Fernand Cortez, nain, grandes fleurs rouge cuivré . . . . .	0,75
—	Fireglow, grandes fleurs écarlate orangé . . . . .	1,—
—	G. A. Strohlein, écarlate orangé, œil carmin . . . . .	0,50
—	Hauptmann Köhl, rouge sang, carminé . . . . .	0,60
—	Jules Sandeau, immenses panicules roses . . . . .	0,50
—	Karl Foerster, orange brillant . . . . .	0,75
—	Lord Rayleigh, nain, le plus près du bleu . . . . .	0,60
—	Mia Ruys, nain, grandes fleurs blanc pur . . . . .	0,60
—	P. D. Williams, fleurs énormes, rose tendre, œil foncé . . . . .	0,50
—	Prof. Went, pourpre amaranthe foncé . . . . .	0,75
—	Roi Albert, vermillon foncé, œil magenta . . . . .	0,75
—	Royal Purple, bleu violet foncé . . . . .	0,75
—	Saladin, orange écarlate brillant . . . . .	0,60
—	Septemberschnee, tardif, blanc, teinté de rose au centre . . . . .	0,75
—	The Mahdi, violet-pourpre foncé . . . . .	0,60
—	Viking, rose saumoné, tardif . . . . .	0,60
—	William Ramsay, pourpre foncé . . . . .	0,60
—	Württembergia = Jules Sandeau . . . . .	0,50
—	Arendsi Inge, rose pur, œil blanc . . . . .	0,60
—	Arendsi Louise, lilas vif, centre cramoisi . . . . .	0,50
—	maculata Alpha, fleurs en longues pyramides, rose brillant, œil foncé . . . . .	0,60

Les phlox vivaces sont d'entre les meilleures plantes d'ornement, plates-bandes, fleurs coupées. Leur grande variété permet des assemblages de couleurs les plus harmonieux. Ils fleurissent l'été et plusieurs variétés se maintiennent jusqu'aux gelées.



Phlox Douglasii



		Fr.
V R	<b>Phygellus capensis</b> . . . . .	1,—
	— <i>coccineus</i> . . . . .	1,—
+ †	<b>Physalis Alkekengi</b> . . . . .	0,50
V +	<b>Physostegia virginiana</b> . . . . .	0,50
Belle véronique à épis roses.		
R M	<b>Phyteuma Charmelii</b> . . . . .	1,—
M	— <i>comosum</i> . . . . .	2,50
M	— <i>hemisphaericum</i> . . . . .	1,50
Pr R	— <i>orbiculare</i> . . . . .	0,50
M	— <i>pauciflorum</i> . . . . .	1,50
M	— <i>Scheuchzeri</i> . . . . .	0,50
R □	— <i>spicatum album</i> . . . . .	0,50
	— <i>var. coeruleum</i> . . . . .	0,50
T	<b>Pinguicula alpina, Juratense,</b>	
	— <i>longifolia, Reuteri</i> . . . . .	1,—
T	— <i>vulgaris</i> . . . . .	0,50
V +	<b>Platycodon autumnale</b> . . . . .	1,—
V +	— <i>grandiflorum et var. al-</i>	
	— <i>bum</i> . . . . .	0,50
V R +	— <i>Mariesi et var. album</i> . . . . .	0,50
Ce sont des Campanules tuberculeuses à grandes fleurs bleues ou blanches. Culture très facile. Excellentes pour fleurs coupées. Juillet-novembre.		
R Bo	<b>Plumbago Larpentae</b> . . . . .	0,50
R S	— <i>Wilmottiae</i> . . . . .	1,50
Le Plumbago Larpentae est une plante basse et traçante, tapissant le sol. Fleur de Gentiana verna. Ombre ou mi-ombre. Août-novembre.		
O	<b>Podophyllum Emodii</b> . . . . .	1,—
	— <i>var. major</i> . . . . .	1,50
O □	— <i>peltatum</i> . . . . .	1,—
V +	<b>Polemonium carneum (fl. roses)</b>	0,50
V +	— <i>coeruleum</i> . . . . .	0,50
	— <i>var. album</i> . . . . .	0,50
V R +	— <i>Farreri</i> . . . . .	1,—
R	— <i>humile</i> . . . . .	0,75
R V	— <i>occidentalis</i> . . . . .	1,—
V	— <i>robustum</i> . . . . .	1,—
Bonnes plantes pour mi-ombre.		
R	<b>Polygala alpestris</b> . . . . .	0,75
R Δ	— <i>Balansae</i> . . . . .	2,50
Superbe espèce arbustive de l'Atlas.		
R Pr	— <i>calcareae</i> . . . . .	1,—
O Tap	— <i>Chamaebuxus</i> . . . . .	0,75
O M	— <i>rhodoptera (carmin et</i>	
	— <i>jaune)</i> . . . . .	1,—
O M	— <i>Vayredae (idem)</i> . . . . .	1,—
□	<b>Polygonatum biflorum</b> . . . . .	0,75
	— <i>multiflorum</i> . . . . .	0,75
	— <i>verticillatum</i> . . . . .	0,50
Ce sont les Sceau de Salomon, très propres à garnir les sous-bois.		
Tap	<b>Polygonum affine (Brunonis)</b> . . . . .	0,50
R	— <i>alpinum</i> . . . . .	1,—
R Pal Pr	— <i>Bistorta</i> . . . . .	0,50
R Pal	— <i>campanulatum</i> . . . . .	0,60
Δ Tap	— <i>capitatum</i> . . . . .	0,50
V †	— <i>cuspidatum (Sieboldi)</i> . . . . .	0,50
R Tap	— <i>Emodii</i> . . . . .	1,—
R S	— <i>ephedroides</i> . . . . .	1,50
V	— <i>molle (polystachyum)</i> . . . . .	0,60
R N	— <i>viviparum</i> . . . . .	1,—
R Tap	<b>Potentilla alba</b> . . . . .	0,50
R	— <i>alchemilloides</i> . . . . .	1,—
R	— <i>alpestris</i> . . . . .	0,50
R Tap	— <i>ambigua</i> . . . . .	0,60
Pal	— <i>Anserina</i> . . . . .	0,50

		Fr.
	<b>Potentilla (suite)</b>	
R	— <i>argyrophylla</i> . . . . .	0,60
R V +	— <i>atrosanguinea</i> . . . . .	0,50
	— <i>var. Gibson's Scarlet</i>	0,75
	— <i>Etna</i> . . . . .	0,75
R Pr	— <i>aurea</i> . . . . .	0,50
R	— <i>Beesii (arbuste)</i> . . . . .	1,50
R	— <i>cinerea</i> . . . . .	0,60
R	— <i>Clusiana</i> . . . . .	1,—
R	— <i>dahurica (arbuste)</i> . . . . .	1,50
R	— <i>Farreri (arbuste)</i> . . . . .	1,50
R	— <i>fragiformis</i> . . . . .	0,60
R	— <i>Friedrichsenii (arbuste)</i> . . . . .	1,50
R	— <i>fruticosa (arbuste)</i> . . . . .	2,50
R	— <i>fulgens</i> . . . . .	1,—
R	— <i>grandiflora</i> . . . . .	0,50
R	— <i>Hippiana</i> . . . . .	1,—
R	— <i>mandschurica</i> . . . . .	1,—
R V	— « <i>Master Floris</i> » . . . . .	0,75
R	— <i>megalantha</i> . . . . .	1,50
V R +	— <i>nepalensis</i> . . . . .	0,50
	— <i>vars. Roxana et Wil-</i>	
	— <i>mottiae</i> . . . . .	0,50
R	— <i>nevadensis</i> . . . . .	1,—
R M Tap	— <i>nitida</i> . . . . .	0,50
	— <i>alba</i> . . . . .	1,—
R M	— <i>ivalis</i> . . . . .	0,75
M Mo	— <i>nivea</i> . . . . .	1,—
R	— <i>pedemontana</i> . . . . .	1,—
R	— <i>Purdomi (arbuste)</i> . . . . .	1,50
R M	— <i>pygmaea</i> . . . . .	1,—
R †	— <i>reptans fl. pl.</i> . . . . .	0,50
M	— <i>rupestris</i> . . . . .	0,50
	— <i>var. grandiflora</i> . . . . .	0,50
R H	— <i>Salesoviana</i> . . . . .	1,—
R	— <i>sanguisorbaefolia</i> . . . . .	1,50
R	— <i>speciosa</i> . . . . .	1,50
R	— <i>Tommasiniana</i> . . . . .	1,—
T Pal	— <i>Tormentilla</i> . . . . .	0,50
R ●	— <i>Valderia</i> . . . . .	1,50
R	— <i>Veitchii (arbuste)</i> . . . . .	1,50
R M	— <i>verna</i> . . . . .	0,50
Les Potentilla en arbustes sont des formes locales de fruticosa, très caractérisées.		
R V	<b>Poterium (Sanguisorba) obtu-</b>	
	— <i>sum</i> . . . . .	0,60
	— <i>rupicolum</i> . . . . .	1,—
O □	<b>Prenanthes purpurea</b> . . . . .	0,50

## PRIMEVÈRES

## a) Groupe espèces saxatiles.

M N	<b>Primula Allionii</b> . . . . .	1,—
Plantes bien enracinées.		
R M	— <i>Auricula alpina</i> . . . . .	0,50
	— <i>vars. grandiflora, ita-</i>	
	— <i>lica, rosea et serrati-</i>	
	— <i>folia</i> . . . . .	1,—
V R	— <i>Prim. Auricules des jar-</i>	
	— <i>dins, à fleurs bleu-lilas,</i>	
	— <i>rouge ou en mélange</i> . . . . .	0,50
R M	— <i>Briscoeii</i> . . . . .	2,50
R M	— <i>calycina (glaucescens)</i> . . . . .	1,—
R M N	— <i>carniolica</i> . . . . .	1,—
R M	— <i>ciliata</i> . . . . .	2,50
R M N	— <i>Clusiana</i> . . . . .	1,—
R M N	— <i>cottia</i> . . . . .	1,50





Primula marginata.

	Fr.
R	Primula (suite)
R	— Facchini . . . . .
M	— Garibaldiana . . . . .
M	— glutinosa . . . . .
R M N	— Heerii . . . . .
R M	— hirsuta (viscosa Vill.) . . . . .
R M N	— — var. nivalis . . . . .
R M N	— integrifolia . . . . .
R M N	— latifolia (graveolens, viscosa All.) . . . . .
R M N	— marginata . . . . .
R	— minima . . . . .
R Δ	— Palinuri . . . . .
R M N	— pedemontana . . . . .
R M N	— spectabilis . . . . .
M N	— tyrolensis . . . . .
R M N	— viscosa, voir hirsuta et latifolia.
R M N	— Wulfeniana . . . . .

Toutes ces primevères fleurissent de mars en mai et préfèrent une position horizontale dans les fentes d'un mur ou d'un rocher; mi-soleil.

## b) Espèces aimant la fraîcheur.

R H	Primula anisodora . . . . .	1,50
T H	— auriculata . . . . .	1,50
R H	— burmanica . . . . .	1,—
R H	— Bulleyana . . . . .	0,75
R H	— Bullesii . . . . .	0,75
R H	— chionantha . . . . .	0,75
R	— Cockburniana . . . . .	1,—

## Primula (suite)

R H	— conspersa . . . . .	1,—
R H	— darialica . . . . .	1,50
T Pal H	— farinosa . . . . .	0,50
R H	— — grandiflora . . . . .	2,50
T H Pal	— Florindae . . . . .	0,60
R H	— frondosa . . . . .	1,50
R H	— grandis . . . . .	1,50
R H	— glycosma . . . . .	1,—
T H	— helodoxa . . . . .	1,50
R H	— involucrata . . . . .	1,—
R H Pal	— japonica . . . . .	0,50
	— — vars. alba, Etna et atrosanguinea . . . . .	0,50
T H	— longiflora . . . . .	0,75
T H	— luteola . . . . .	0,75
T H	— microdonta . . . . .	1,—
	— — alpicola . . . . .	1,—
T H	— modesta . . . . .	1,—
R H	— Poissonii . . . . .	1,50
R H	— prionotes . . . . .	1,—
T R H	— pudibunda . . . . .	2,50
R H	— pulverulenta . . . . .	0,60
R H	— rosea . . . . .	0,50
	— — splendens . . . . .	0,75
T H	— scotica . . . . .	1,—
R O	— sikkimensis . . . . .	0,75
R H	— sibirica . . . . .	1,50
	— — var. chinensis . . . . .	2,—
R H	— vittata . . . . .	0,75
R H	— Waltonii . . . . .	1,50
T H	— Wardii . . . . .	1,50
T H	— Watsonii . . . . .	1,50
T H	— Wilsonii . . . . .	1,—

Ces espèces préfèrent un sol poreux, légèrement humide et mi-ombre.

## c) Espèces siliceoles craignant la chaux.

R Mo	Primula capitata . . . . .	1,—
R Mo	— capitellata . . . . .	1,—
R Mo	— crispata . . . . .	1,50
R Mo	— lepta . . . . .	1,50
R	— lichiangensis . . . . .	2,50
R Mo	— Littoniana . . . . .	1,50
R Mo	— muscarioides . . . . .	1,50
R Mo	— Mooreana . . . . .	1,—
R Mo	— nivalis . . . . .	2,50
T Mo	— plantaginea . . . . .	1,50
R	— secundiflora . . . . .	1,—
R	— Sieboldii . . . . .	1,—
R Mo	— sino-purpurea . . . . .	1,50

Plantes très variables allant du blanc au rouge foncé, dont nous avons sélectionné de nombreuses variétés dans nos jardins du Jura.

R Mo	— sphaerocephala . . . . .	1,50
R	— Veitchii . . . . .	1,—

Sol dépourvu de calcaire; exposition mi-ombragée.

## d) Espèces de pleine terre ordinaire.

R Bo Pr	Primula acaulis . . . . .	0,50
R H	— cachemiriana . . . . .	0,50
	— — vars. alba et grandiflora . . . . .	0,75
R	— coerulea . . . . .	1,—
R	— cortusoides . . . . .	0,75
R	— denticulata . . . . .	0,75



	Fr.		Fr.
<b>Primula (suite)</b>		<b>Ranunculus</b>	
R □ Pr — elatior . . . . .	0,50	M N — pyrenaica . . . . .	0,50
— — vars. major et splen-		R □ — aconitifolius . . . . .	0,50
— — dens . . . . .	0,75	R M N — alpestris . . . . .	1,—
— — Goldlacet . . . . .	0,75	R S — amplexicaulis . . . . .	1,—
R — « Floralie » . . . . .	0,75	R S — calandrinoides . . . . .	2,50
R — Helenae . . . . .	0,75	R — caucasicus . . . . .	0,60
R — heterochroma . . . . .	0,50	O □ — Ficaria albus . . . . .	0,50
R Bo — Juliae . . . . .	0,75	O □ — — fl. pl. . . . .	0,50
R — « La Chénoise » . . . . .	0,60	Sp Mo — glacialis . . . . .	1,—
R — lutea plena . . . . .	1,20	R S — gramineus . . . . .	0,60
R Pr — officinalis . . . . .	0,50	R S — illyricus . . . . .	0,50
— — fl. rouges . . . . .	0,50	Aq — Lingua . . . . .	0,50
R — pannonica . . . . .	0,50	R S — millefoliatius . . . . .	1,—
R — « Primavera » . . . . .	1,—	R S — monspeliacus . . . . .	0,50
R — rosea plena . . . . .	1,20	R — montanus . . . . .	0,50
R — Ruprechtii . . . . .	1,50	R S M — parnassifolius . . . . .	1,50
Pr Bo □ — veris . . . . .	0,50	R Pr — pyrenaicus . . . . .	0,50
C'est la Primevère multicolore des vieux jardins, que les Anglais ont amené à un haut degré de perfectionnement et dont nous offrons les meilleures variétés.		R † — reptans fl. pl. . . . .	0,50
R — Wanda . . . . .	0,75	R N — rutaefolius (Callianth.) . . . . .	1,—
Tout ce groupe de Pr. comprend des espèces extrêmement robustes, prospérant dans tout terrain frais et sain, riche et profond; mi-ombre.		R M Mo — Seguieri . . . . .	1,—
R Tap Bo <b>Prunella</b> grandiflora, var. alba . . . . .	0,50	R S — Thora . . . . .	0,60
— — laciniata . . . . .	0,50	R M Δ <b>Raoulia</b> australis . . . . .	0,50
R M <b>Pterocephalus</b> (Scabiosa) Parnassii . . . . .	0,50	R — <b>Rehmannia</b> angulata . . . . .	1,—
R □ <b>Pulmonaria</b> azurea, maculata, rubra . . . . .	0,60	R — <b>Reineckia</b> carnea . . . . .	1,—
R <b>Puschkinia</b> libanotica . . . . .	0,50	R — <b>Reseda</b> glauca . . . . .	1,—
— — alba . . . . .	0,50	R V <b>Rhazya</b> orientalis . . . . .	1,50
— — scilloides . . . . .	0,50	V Med <b>Rheum</b> officinale . . . . .	1,—
<b>Pulsatilla</b> , voir Anemone.		V — palmatum . . . . .	1,—
R Δ <b>Putoria</b> calabrica . . . . .	1,—	<b>Rhododendron</b> , voir arbustes.	
R <b>Pyrethrum</b> cinerarifolium . . . . .	0,75	R M <b>Rhodiola</b> integrifolia et rosea . . . . .	1,—
V + — roseum et hybrides . . . . .	0,75	Pal <b>Rodgersia</b> pinnata, podophylla et tabularis . . . . .	1,50
Nombreuses variétés à fleurs simples et doubles.		V R S <b>Romneya</b> Coulteri . . . . .	1,50
R Bo Tap — <b>Pyrola</b> rotundifolia, uniflora . . . . .	1,—	V R S — trichocalyx . . . . .	2,50
		R S <b>Romulea</b> Bulbocodium, corsica . . . . .	1,—
		Iridées minuscules provenant de Corse.	
		R S <b>Rosmarinus</b> officinalis et var. albus . . . . .	1,—
		— — var. atrocoeruleus . . . . .	1,50
		R S Δ — prostratus . . . . .	1,50
		R † <b>Rubus</b> arcticus et saxatilis . . . . .	0,50

## RUDBECKIA

<b>Rudbeckia</b> laciniata Goldstrahl, 200 cm., belles fleurs jaune-or, doubles . . . . .	0,60
— Neumanni (Rud. speciosa), 60 cm., jaune orangé, centre noir . . . . .	0,60
— nitida Autumn Glory, 200 cm., grandes fleurs jaunes, simples . . . . .	0,60
— purpurea (Echinacea), 80 cm., grandes fleurs pourpre-carmin . . . . .	0,75
— — Earliest of All, 100 cm., pourpre-cramoisi . . . . .	1,25
— — Leuchtstern, 100 cm., plante magnifique, carmin vif . . . . .	1,25
— subtomentosa, 100 cm., tiges portant plusieurs petites fleurs jaune-orange, centre noir . . . . .	0,60

R <b>Ruellia</b> ciliosa . . . . .	1,50	V <b>Salvia</b> azurea grandiflora . . . . .	0,75
R S Med <b>Ruta</b> graveolens . . . . .	0,60	O □ — glutinosa . . . . .	1,—
R S Δ — montana . . . . .	1,50	Med V R — officinalis . . . . .	0,50
R M † — patavina . . . . .	1,—	— — vars. alba, grandiflora et rosea . . . . .	1,—
R Tap <b>Sagina</b> procumbens . . . . .	0,50	— — var. tricolor . . . . .	1,50
Aq <b>Sagittaria</b> japonica et sagittifolia . . . . .	1,—	R Δ V — patens, bleu magnifique . . . . .	1,50
<b>Salix</b> glauca, herbacea, reticulata, retusa et serpyllifolia . . . . .	1,—	R S — ringens . . . . .	1,—
Saules alpins nains, rampant sur le sol et tapissant les rochers et les lieux frais des rocaillies; nord ou mi-ombre. Voir aux arbustes.		R S — scabiosaefolia . . . . .	1,50
		R Arom — Sclarea . . . . .	0,50
		R Δ — uliginosa . . . . .	1,50
		R O <b>Sanguinaria</b> canadensis . . . . .	0,75



		Fr.
S Arom	<b>Santolina</b> Chamaecyparissus . . .	0,50
Excellente plante buissonnante pour constituer des bordures. Fin feuillage argenté; fleurs jaunes.		
S	— incana . . . . .	0,75
S	— viridis . . . . .	0,75
R M	<b>Saponaria</b> Boissieri . . . . .	0,50
R M	— caespitosa . . . . .	0,60
M	— cypria . . . . .	1,50
R M	— lutea . . . . .	1,—
R M Tap	— ocymoides . . . . .	0,50
	— — vars. alba, carnea	
	et splendens . . . . .	0,50
	— officinalis fl. pl. . . . .	0,50
†	— pulvinaris . . . . .	1,—
M	— Wiemanniana . . . . .	0,60
Sp T	<b>Sarracenia</b> purpurea . . . . .	1,50
M	<b>Satureia</b> diffusa . . . . .	1,50
M	— montana . . . . .	0,50
M	— pygmaea . . . . .	1,50
R M	— repanda . . . . .	0,60
R	— thymifolia . . . . .	1,—
R M	<b>Saussurea</b> depressa . . . . .	1,50

### SAXIFRAGES

Section <i>Bergenia</i> ou <i>Megasea</i> .		
Bo R	<b>Saxifraga</b> Beesiana, cordifolia, crassifolia, Delavayi, Leichtlinii, pacifica, Stracheyi, yunnanensis . . . . .	1,—
Plantes à larges feuilles épaisses, à fleurs roses en grappes serrées. Mars-mai, mi-ombre, sol ordinaire.		

#### Section *Boraphila*.

	<b>Saxifraga</b> Hammondi . . . . .	1,50
	— hieracifolia . . . . .	1,50
	— pennsylvanica . . . . .	1,50
	— punctata . . . . .	1,50
	— stellaris . . . . .	1,—

Fraicheur, humidité, mi-soleil; avril-mai.

#### Section *Cymbalaria* (fleurs jaunes).

O	<b>Saxifraga</b> Huetiana (dz. 4,—) . . . . .	0,50
---	---	------

#### Section *Dactyloides* (Mousses).

R Tap	<b>Saxifraga</b> ajugaefolia . . . . .	1,—
R Tap	— Allionii (Kingii, densa) . . . . .	0,50
T M	— androsacea . . . . .	1,50
R Tap	— atropurpurea . . . . .	0,50
R Tap Bo	— caespitosa . . . . .	0,50
R	— Camposii . . . . .	1,—
R Bo	— canaliculata . . . . .	0,75
R	— capitata . . . . .	1,—
R M	— cervicornis . . . . .	0,75
R M	— conifera . . . . .	1,—
R Tap	— corbariensis . . . . .	1,50
M	— cuneata . . . . .	1,50
R Tap	— decipiens . . . . .	0,50
Nombreuses variétés horticoles à 0,50.		
R Tap	— exarata . . . . .	0,75
R M	— gemmifera . . . . .	1,—
R	— geranioides (vrai) . . . . .	1,—
R M	— globifera . . . . .	1,—
R Tap	— hypnoides . . . . .	0,50
R M	— moschata . . . . .	1,—
R M	— muscoides (varians) . . . . .	0,50
	— pedatifida . . . . .	1,—

### *Saxifraga* (suite)

M N	— pedemontana . . . . .	1,50
R	— perdurans . . . . .	1,—
M	— pubescens . . . . .	1,—
R Tap	— Rhei . . . . .	0,50

Nombreuses variétés horticoles à 0,50.

R	— sponhemica . . . . .	1,—
R Tap	— Stelleriana . . . . .	1,—
	— tenella . . . . .	0,—
R	— tricuspidata . . . . .	1,—
R Bo	— trifurcata . . . . .	0,50
R Tap	— Wilkommiana . . . . .	1,—

Plantes cespitueuses à rameaux étalés sur le sol, qu'ils recouvrent comme des mousses. Ombre ou mi-soleil; mai-juin.

#### Section *Diptera*.

	<b>Saxifraga</b> corthusoides . . . . .	1,—
	— cuscutaeformis . . . . .	1,50
	— Fortunei . . . . .	1,50
	— japonica . . . . .	1,50
	— sarmentosa . . . . .	0,50

Plantes chinoises ou japonaises; position abritée; mi-ombre.

#### Section *Euaizoonia*.

R M	<b>Saxifraga</b> Aizoon . . . . .	0,50
	— vars. brevifolia, carinthiaca, caucasica, Churchillii, flavescens, lutea, Malyi, marginata, minima, microphylla, rosea . . . . .	0,60
R M	— altissima . . . . .	0,50
R M	— balkana . . . . .	0,50
R M	— cartilaginea . . . . .	0,75
R M	— catalaunica . . . . .	0,75
R M	— cochlearis (vrai) . . . . .	0,50
R	— Correvoniana . . . . .	1,—
R M N	— Cotyledon (pyramidalis) . . . . .	0,50
	— Cotyledon X Aizoon . . . . .	1,50
R M	— crustata . . . . .	0,50
R M	— elatior . . . . .	0,50
R M	— Gaudinii . . . . .	1,—
R M	— Hostii . . . . .	0,50
	— major . . . . .	0,75
R M	— Kolenatiana . . . . .	0,50
R M	— lantoscana . . . . .	0,50
R M N	— lingulata . . . . .	1,—
R M S	— longifolia . . . . .	0,60 et 0,75
	— longifolia X Cotyledon . . . . .	2,50
	— var. major . . . . .	1,50
R M	— Macnabiana . . . . .	0,75
R M	— montavoniensis . . . . .	1,—
H M	— mutata . . . . .	0,50
R	— pectinata . . . . .	0,50
R M	— Probynii (cochlearis minor) . . . . .	1,50
R M	— Portae . . . . .	0,50
R	— pseudo-Forsteri . . . . .	1,50
R M	— rhaetica . . . . .	0,50
R M	— splendens . . . . .	2,50
R M	— Stabiana . . . . .	0,50
R	— Zimmeteri . . . . .	1,50

Habitent les lieux rocheux et ensoleillés de l'Europe. Feuillage dur et crustacé, d'un vert glauque, très robuste; seul *S. mutata* à fleur rougeâtre demande un sol frais et humide.



	Fr.
<b>Section Tristylea.</b>	
<b>Saxifraga florulenta</b> . . . . .	3,—
Fentes des rochers granitiques, à l'est, au nord ou à l'ouest.	
<b>Section Hirculus.</b>	
<b>Saxifraga Hirculus</b> . . . . .	1,50
Plantes marécageuses des lieux frais; fleur jaune orangé.	
<b>Sections Kabschia et Engleria.</b>	
<b>Saxifraga</b> Ada . . . . .	0,75
Alberti . . . . .	0,50
anormalis . . . . .	0,75
apiculata . . . . .	0,50
Arco-Valley . . . . .	1,—
aretioïdes . . . . .	1,—
Lady Beatrix Stanley . . . . .	1,—
Bilekii . . . . .	1,—
Boedkleri . . . . .	1,—
Borisii . . . . .	1,—
Boryi . . . . .	1,—
Boydii . . . . .	0,75
Burseriana . . . . .	0,75
— sulfurea . . . . .	1,—
caesia . . . . .	1,—
caucasica . . . . .	1,—
Cherry-Tree . . . . .	1,—
chondrophylla . . . . .	0,75
Clarkei . . . . .	1,—
coriophylla . . . . .	1,—
Delphii . . . . .	1,50
Desoulavayi . . . . .	1,—
diapsensioïdes . . . . .	2,50
Elisabethae . . . . .	0,75
erubescens . . . . .	1,—
Eudoxiana . . . . .	1,—
Ferdinand-Coburgi . . . . .	0,75
Fontanae . . . . .	1,—
Frederici-Augusti . . . . .	1,50
Franzii . . . . .	1,50
Gauderi . . . . .	1,—
grata . . . . .	1,—
Haagii . . . . .	0,75
Hedwigii . . . . .	1,—
Heinrichii . . . . .	1,50
Irwingii . . . . .	0,75
Jenkinsii . . . . .	0,75
juniperifolia . . . . .	1,—
C'est ici la plus jolie section du genre; petites touffes formant pelotes, à feuillage serré, recouvert de fleurs; mars-juin. Murs ou fentes de rochers. Levant, couchant ou nord.	
<b>Section Nephrophyllum et Sibiricae.</b>	
<b>Saxifraga chrysosplenifolia</b> . . . . .	1,—
R — granulata . . . . .	0,60
□ — rotundifolia . . . . .	0,50
Ombre ou mi-ombre.	
<b>Section Peltiphyllum.</b>	
<b>Saxifraga peltata</b> . . . . .	1,—
Sol humide riche en humus.	
<b>Section Porphyron.</b>	
<b>Saxifraga oppositifolia</b> . . . . .	0,50
— — vars. alba, atrosanguinea, grandiflora, latina, pyrenaica . . . . .	1,—

	Fr.
<b>Saxifraga (suite)</b>	
— retusa . . . . .	1,50
— Rudolphiana . . . . .	2,50
Touffes naines et étalées sur le sol, se recouvrant de mars en mai de fleurs carmin très vif ou roses suivant les espèces; murs ou rocaillies au nord, ou mi-soleil.	
<b>Section Robertsonia.</b>	
<b>Saxifraga Andrewsii</b> (Guthrieana) . . . . .	0,75
— Bucklandii . . . . .	0,50
— cuneifolia . . . . .	0,50
— Geum . . . . .	0,50
— hirsuta . . . . .	0,50
— primuloides . . . . .	1,—
— umbrosa . . . . .	0,50
Bonnes plantes nommées « Désespoir du peintre » à cause de la finesse de leurs fleurs blanches pointillées de pourpre. Le S. umbrosa est le London Pride des Anglais. Rocailles, bordures, à l'ombre et au mi-soleil; mai-juin.	
<b>Section Trachyphyllum.</b>	
<b>Saxifraga aizoides</b> . . . . .	0,75
— aspera . . . . .	1,—
— — v. aurantiaca . . . . .	1,—
— bronchialis . . . . .	1,—
— conferta . . . . .	1,—
— bryoides . . . . .	1,—
— primulaïze . . . . .	1,50
— tenella . . . . .	1,—
Touffes cespitueuses, à feuilles velues, ciliées, à fleurs blanches ou jaune rougeâtre. Sol humide et mi-ombragé; mai-août.	
V + <b>Scabiosa caucasica</b> et var. alba . . . . .	0,50
— perfecta . . . . .	0,60
R M — graminifolia . . . . .	0,75
V R M — lyratifolia (fl. grenat) . . . . .	0,75
R — silenifolia . . . . .	1,—
R Δ <b>Schizostylis coccinea</b> et var. rosea . . . . .	1,—
R □ <b>Scilla amoena</b> . . . . .	0,50
R — autumnalis . . . . .	0,50
Pr R — bifolia . . . . .	0,25
— — vars. alba et rosea . . . . .	0,75
R □ — campanulata . . . . .	0,50
R — chinensis . . . . .	1,50
R — hispanica . . . . .	1,50
R — italica . . . . .	0,50
R — japonica . . . . .	1,—
□ — Lilio-hyacinthus . . . . .	1,—
R □ — nutans et var. alba . . . . .	0,50
R — pratensis . . . . .	0,50
R Pr — sibirica . . . . .	0,50
R — taurica . . . . .	0,50
R <b>Scorzonera rosea</b> . . . . .	1,50
R M <b>Scutellaria alpina</b> . . . . .	0,50
— — var. alba . . . . .	0,75
R — — rosea . . . . .	1,—
R — baikalensis . . . . .	0,75
R — demnatensis . . . . .	0,75
R — indica . . . . .	0,75
R — japonica . . . . .	0,75
R — lupulina . . . . .	0,75
R M — orientalis . . . . .	0,50
R — pinnatifida . . . . .	0,60
R — tuberosa . . . . .	0,50



		Fr.
<b>Sedum</b>		
acre . . . . .	0,25	Lidakense . . . . . 1,—
acutifolium . . . . .	0,50	Lieb mannianum . . . . . 0,50
Alberti . . . . .	0,50	lineare . . . . . 1,50
albescens . . . . .	0,50	lydium . . . . . 0,75
album . . . . .	0,25	magellense (olympicum) . . . . . 0,50
— vars. pallidum roseum et virescens . . . . .	0,50	mexicanum . . . . . 1,—
altissimum . . . . .	0,50	multiceps . . . . . 1,—
amplexicaule . . . . .	0,50	murale . . . . . 0,50
Anacampseros . . . . .	0,50	Nevii . . . . . 1,—
anglicum . . . . .	0,50	nicaense . . . . . 0,50
anopetalum . . . . .	0,50	ochroleucum . . . . . 0,50
asiaticum (crassipes) . . . . .	1,—	oppositifolium . . . . . 0,75
Beckeri . . . . .	0,75	oreganum . . . . . 1,—
bellum . . . . .	1,50	pachyphyllum . . . . . 2,50
Beyrichianum . . . . .	1,—	pallidum . . . . . 0,50
boloniense . . . . .	0,50	Palmeri . . . . . 1,—
brevifolium . . . . .	1,—	parvistamineum . . . . . 1,50
calabricum . . . . .	1,—	pilosum . . . . . 0,60
cauticolum . . . . .	1,—	polonicum . . . . . 1,—
corsicum (glanuliferum) . . . . .	1,—	populifolium . . . . . 0,60
crista galli . . . . .	1,—	Praegerianum . . . . . 1,50
cruciatum . . . . .	1,—	primuloides . . . . . 1,—
cupressoides . . . . .	2,50	reflexum (montanum) . . . . . 0,50
dasyphyllum . . . . .	0,50	reflexum vars. monstrosum et majus . . . . . 0,75
divergens . . . . .	1,—	rupestre . . . . . 0,50
diversifolium . . . . .	1,50	sarmentosum . . . . . 1,—
dumulosum . . . . .	1,—	sempervivoides (umbil. semp.) . . . . . 1,—
Ellacombianum . . . . .	0,75	sexangulare . . . . . 0,50
elongatum . . . . .	0,75	Sieboldii . . . . . 0,60
Ewersii . . . . .	0,50	— fol. car. . . . . 1,50
farinosum . . . . .	1,50	spathulifolium . . . . . 0,50
floriferum . . . . .	1,—	atropurpureum . . . . . 0,60
Forsterianum . . . . .	0,75	spurium . . . . . 0,25
fruticosum . . . . .	1,50	— splendens . . . . . 0,50
fusiforme . . . . .	1,50	Floraison d'été superbe; excellent pour les jardins de montagne.
glaucum . . . . .	0,50	Stahlii . . . . . 0,50
— aureum . . . . .	0,50	stenopetalum . . . . . 1,—
heterodontum . . . . .	1,—	stoloniferum . . . . . 1,—
hispanicum . . . . .	0,50	Tatarinowii . . . . . 1,50
— var. minor . . . . .	1,—	tenellum . . . . . 0,50
hirsutum . . . . .	1,50	turkestanicum . . . . . 0,60
humifusum . . . . .	1,—	valerianoides . . . . . 1,50
intermedium . . . . .	0,50	Verlotii . . . . . 0,50
involutum . . . . .	0,50	Winkleri . . . . . 1,50
kamtschaticum . . . . .	0,50	
— fol. var. . . . .	0,60	
Kirilowii . . . . .	0,75	
lapponicum . . . . .	0,50	

## Espèces plus élevées.

<b>Sedum</b>		
Aizoon . . . . .	0,50	Rhodiola . . . . . 1,—
atrosanguineum . . . . .	1,50	rubricaula . . . . . 1,—
Fabaria . . . . .	0,50	Selskianum . . . . . 1,—
« Brillant » . . . . .	0,50	spectabile . . . . . 0,50
maximum (latifolium) . . . . .	0,50	— var. splendens . . . . . 1,—
Middendorffianum . . . . .	0,50	Telephium . . . . . 0,50

		Fr.
<b>Selaginella, voir Fougères.</b>		
R Δ	<b>Sempervivella alba . . . . .</b>	<b>1,50</b>
<b>Sempervivum</b>		
acuminatum . . . . .	0,50	Huteri . . . . . 1,—
Allionii . . . . .	0,50	juratense . . . . . 0,50
Alpha . . . . .	0,50	Kapaornikense . . . . . 1,—
alpinum . . . . .	0,75	Kindingeri . . . . . 1,50
ambiguum . . . . .	0,50	Kosanini . . . . . 1,50
arachnoideum . . . . .	0,50	Laggeri . . . . . 0,50
arenarium . . . . .	0,50	Laharpei . . . . . 0,50
arvernense . . . . .	0,50	Lamottei . . . . . 0,50
assimile . . . . .	0,50	latifolium . . . . . 0,50
atlanticum . . . . .	1,—	leucanthum . . . . . 0,50
atropurpureum . . . . .	1,—	macedonicum . . . . . 1,—
atroviolaceum . . . . .	0,50	metallicum . . . . . 0,75
Aureggii . . . . .	0,50	Mettenianum . . . . . 0,50
barbulatum . . . . .	0,50	minutum . . . . . 0,50
Belladonna . . . . .	0,50	montanum . . . . . 0,50
beta . . . . .	0,50	monticolum . . . . . 0,50
blandum . . . . .	0,50	morellianum . . . . . 0,50
Borisii . . . . .	1,50	murale . . . . . 0,50
Bourgeanum . . . . .	0,75	Murithii . . . . . 0,75
Boissieri . . . . .	0,50	Neideri . . . . . 1,—
Boutignyanum . . . . .	0,50	Neilreichii . . . . . 0,75
Braunii . . . . .	0,50	nigrum . . . . . 0,50
bryoides . . . . .	0,50	obtusatum . . . . . 0,50
Bungeanum . . . . .	0,50	obtusifolium . . . . . 0,50
Burnatii . . . . .	0,75	orbiculatum . . . . . 0,75
calcareum . . . . .	0,50	ornatum . . . . . 0,75
Camposii . . . . .	0,50	Pallasii . . . . . 1,50
carniolicum . . . . .	0,50	pallescens . . . . . 0,75
caucasicum . . . . .	0,50	pannonicum . . . . . 0,50
Chaboisseautii . . . . .	0,50	parvulum . . . . . 0,50
charolensis . . . . .	1,—	patens . . . . . 1,—
Christii . . . . .	0,75	penninum . . . . . 0,50
ciliolum . . . . .	1,—	piliferum . . . . . 0,50
cinarescens . . . . .	0,75	Pilosella . . . . . 0,50
commutatum . . . . .	0,50	pilosum . . . . . 1,—
Comollii . . . . .	0,50	Pittonii . . . . . 1,50
Corni di Canzo . . . . .	0,50	Pomellii . . . . . 0,75
cornutum . . . . .	0,50	praestabile . . . . . 0,50
crassicaule . . . . .	0,50	pumilum . . . . . 0,50
cupreum . . . . .	0,50	Reginae-Amaliae . . . . . 1,50
dichotomum . . . . .	0,50	Requienii . . . . . 0,50
Doellianum . . . . .	0,50	rhodanicum . . . . . 0,50
elegans . . . . .	0,50	robustum . . . . . 0,50
erythraeum . . . . .	1,50	rubellum . . . . . 0,50
Fauconnetii . . . . .	0,50	rubicundum . . . . . 0,75
flagelliforme . . . . .	0,50	rubricaula . . . . . 1,—
Fontanae . . . . .	0,50	rubrum . . . . . 0,50
Funkii . . . . .	0,50	rupestre . . . . . 0,50
Gaudinii . . . . .	0,75	rupicolum . . . . . 0,50
glaucum . . . . .	0,50	ruthenicum . . . . . 0,50
globiferum . . . . .	0,75	Schlehani . . . . . 0,75
graecum . . . . .	1,—	Schnittspahnii . . . . . 0,50
Greenii . . . . .	0,50	Schottii . . . . . 0,50
grignense . . . . .	0,75	Seguieri . . . . . 0,50
Guillemottii . . . . .	0,50	Simonkaianum . . . . . 1,50
Hausmannii . . . . .	0,50	soboliferum . . . . . 0,50
Haynaldii . . . . .	0,75	spinulifolium . . . . . 1,—
helveticum . . . . .	0,75	Stansfieldii . . . . . 1,—
heterotrichum . . . . .	0,50	Studerii . . . . . 0,50
Heuffelii . . . . .	1,—	styriacum . . . . . 1,—
Hillebrandtii . . . . .	0,75	tectorum . . . . . 0,50
hirtum . . . . .	0,50	Thomayeri . . . . . 0,50
humile . . . . .	0,50	



			Fr.
<b>Sempervivum (suite)</b>			
tomentosum . . .	0,75	Verlotii . . .	0,50
triste . . .	0,75	violascens . . .	0,50
Vaccarii . . .	0,75	Webbianum . . .	0,75
valesiacum . . .	0,50	Wulfeni . . .	0,50
villosum . . .	0,75	Zelevori . . .	0,75

Les Joubarbes sont extrêmement précieuses pour la garniture de rochers, de vieux murs, bordures de plate-bandes; ce sont les plus solides d'entre les plantes. Leur aspect de petits artichauts, le fait que leurs rosettes affectent des formes et des couleurs très diverses, les font rechercher par les collectionneurs, qui les cultivent en pots, en rocailles ou au sommet des murs. Nous les collectionnons depuis plus d'un demi-siècle et avons publié à leur sujet un volume annoncé ici avec nos autres ouvrages.

R	<b>Senecio</b>	abrotanifolius . . .	0,50
R M	—	adonidifolius . . .	0,50
R	—	aurantiacus . . .	1,50
R M	—	carniolicus . . .	1,—
V R	—	Doria (macrophyllus) . . .	0,50
R	—	Doronicum . . .	0,60
R M	—	incanus . . .	0,60
M Mo	—	leucophyllus . . .	1,50
R O	—	Przewalskii . . .	0,75
R	—	tyrolensis . . .	1,—
R Mo M	—	uniflorus . . .	1,50
R S	<b>Sideritis</b>	eubaea . . .	0,50
	—	glacialis . . .	0,75
	—	hyssopifolia . . .	0,50
R M	<b>Silene</b>	acaulis . . .	0,60
	—	alba . . .	1,—
R M N	—	alpestris . . .	0,50
	—	fl. pl. . .	0,60
R M	—	bryoides (elongata) . . .	0,75
R	—	caesia . . .	0,75
R	—	caespitosa . . .	0,75
R	—	campanula . . .	0,75
R	—	caramaniana . . .	1,—
R M	—	ciliata . . .	1,—
M S	—	cordifolia . . .	1,—
R M	—	Correvoniana (acaulis fl. pl.) . . .	1,—
R M N	—	Elisabethae . . .	1,—
Superbe espèce alpine, à grandes fleurs carmin.			
R M	—	exscapa . . .	1,—
R	—	laciniata . . .	0,75
M	—	legionensis . . .	0,75
R M	—	maritima . . .	0,50
	—	var. fl. pl. et rosea . . .	0,60
R	—	Moorcroftiana . . .	0,75
R M	—	Pumilio . . .	1,—
M N	—	pusilla . . .	1,—
● R	—	repens . . .	0,75
R M S	—	Saxifraga . . .	0,50
R Bo M	—	Schaffa . . .	0,50
R	—	swertiaefolia . . .	1,—
M	—	vallesia . . .	0,60
R	—	virginica . . .	1,50
R M	—	Zavadskii . . .	1,50
R	<b>Sisyrinchium</b>	bellum . . .	0,50
R	—	iridifolium . . .	0,50
O	<b>Smilacina</b>	stellata . . .	0,50
R	<b>Solanum</b>	Sinclairii . . .	1,50
Mo T R	<b>Soldanella</b>	alpina . . .	0,50
T Mo H	—	montana, pusilla, villosa . . .	1,50

			Fr.
R V	<b>Solidago</b>	angustifolia, 80 cm., jaune-or . . .	0,60
	—	missouriensis, 60 cm., jaune paille . . .	0,60
	—	reflexa, 180 cm., jaune . . .	0,60
	—	rigida, 80 cm., gros panicules jaunes . . .	0,60
	—	Shortii, 180 cm., immenses panicules jaune or . . .	0,75
	—	spectabile, 120 cm., jaune vif . . .	0,75
R	<b>Spigelia</b>	marylandica . . .	1,—
O □	<b>Spiraea</b>	Aruncus . . .	0,60
R M	—	caespitosa . . .	0,75
Pal	—	filipendula . . .	0,50
	—	decumbens . . .	1,—
Pal	—	gigantea (kamtschatica) . . .	0,75
Pal	—	palmata (rose) . . .	0,75
R H	—	Ulmaria . . .	0,50
	—	vars fl. pl. et fol. aurea . . .	0,75
Pal	—	venusta (rose vif) . . .	1,—
△	<b>Stachys</b>	coccinea . . .	1,—
R	—	corsica . . .	1,—
R	—	glutinosa . . .	1,—
R Bo M	—	lanata . . .	0,50
R †	—	lavandulaefolia . . .	0,60
R	—	rupestris . . .	0,50
R S	<b>Stachelina</b>	dubia . . .	2,50
R S	<b>Statice</b>	auriculaefolia, caspia, cordata, globulariaefolia, Gmelinii, latifolia, minuta, rupicola, sareptana, tatarica . . .	0,75
R	<b>Sternbergia</b>	lutea . . .	0,50
R	—	Fischeriana . . .	1,50
R	<b>Stockesia</b>	cyanea . . .	0,60
R	<b>Stipa</b>	gigantea . . .	1,—
R O ●	<b>Streptopus</b>	amplexifolius . . .	2,50
R	<b>Succisella</b>	Peteri . . .	1,—
R M	<b>Suaeda</b>	splendens . . .	2,50
T	<b>Swertia</b>	perennis . . .	1,—
R M	<b>Symphandra</b>	armena, Hofmannii, pendula . . .	0,75
R	<b>Synthyris</b>	Swetzeri . . .	1,50
VMedArom	<b>Tanacetum</b>	Balsamita . . .	0,50
VMedArom	—	vulgare . . .	0,50
	—	var. crispum . . .	0,50
M N	<b>Telekia</b>	speciosissima . . .	1,—
O	<b>Tellima</b>	grandiflora . . .	0,50
R M	<b>Teucrium</b>	aureum . . .	0,50
R	—	Arduinii . . .	1,—
R M Med	—	Chamaedrys . . .	0,50
	—	alba . . .	1,—
R	—	flavum . . .	0,75
R	—	var. Regium . . .	0,50
R M Arom	—	Marum (Micromeria corsica) . . .	1,50
R M	—	montanum . . .	0,50
R O	—	orientale . . .	1,—
R S M	—	Polium . . .	0,50
R †	—	Pseudo-Chamaedrys . . .	0,50
R M †	—	pyrenaicum . . .	0,50
	—	Requienii . . .	1,—
R N	<b>Thalictrum</b>	alpinum . . .	1,—
R M	—	adanthifolium . . .	0,50
O □	—	aquilegifolium . . .	0,50
	—	var. album . . .	1,—



		Fr.
	<b>Thalictrum (suite)</b>	
R	— Delavayi . . . . .	1,50
V R	— dipterocarpum . . . . .	0,75
	— var. album . . . . .	1,—
R	— Fendleri . . . . .	1,—
H	— flavum . . . . .	1,—
M	— minus . . . . .	0,75
R O	— orientale verum . . . . .	2,50
M Mo	<b>Thlaspi</b> limosellaefolium . . . . .	1,—
R M	— rotundifolium . . . . .	0,60
R	— stylosum . . . . .	0,60

R M Arom **THYMUS**

azoricus . . . . .	0,60	Herba-Baronae . . . . .	1,—
belgradensis . . . . .	0,50	Jankae . . . . .	0,60
caespititus . . . . .	1,—	lanicaulis . . . . .	0,50
cinicinus . . . . .	0,50	lanuginosus . . . . .	0,50
citriodorus . . . . .		Marschallianus . . . . .	0,50
— var. argen-		Morellianus . . . . .	0,75
teus . . . . .	0,60	odoratissimus . . . . .	0,50
— var. aureus . . . . .	0,60	serbicus . . . . .	0,50
carmineus . . . . .	0,60	Serpyllum . . . . .	0,50
comptus . . . . .	0,60	— album . . . . .	0,50
Doerfleri . . . . .	0,50	villosus . . . . .	0,60
ericaefolius . . . . .	0,75	vulgaris . . . . .	0,50
glaucus . . . . .	0,75		

Cette collection de Thymus et Serpolets est précieuse pour la composition de pelouses fleuries en terrains secs et arides, ou pour placer entre des dalles.

O □	<b>Tiarella</b> cordifolia et purpurea . . . . .	0,50
H T	<b>Tofieldia</b> calyculata et glacialis . . . . .	1,—
R M	<b>Townsendia</b> Wilcoxiana . . . . .	0,60
R M	<b>Trachelium</b> coeruleum . . . . .	1,—
V	<b>Tradescantia</b> virginica . . . . .	0,50
	— vars. rosea . . . . .	0,75
Pal	<b>Trieyrtis</b> hirta . . . . .	0,75
Pal	— macropoda . . . . .	1,50
R Pr	<b>Trifolium</b> alpinum . . . . .	1,—
O ●	<b>Trillium</b> grandiflorum . . . . .	1,—
H	<b>Trollius</b> aurantiacus . . . . .	1,50
H	— europaeus . . . . .	0,50
H	— hybridus . . . . .	1,—
H	— pumilus . . . . .	1,—
H	— sinensis . . . . .	1,—
H	— yunnanensis . . . . .	1,—

**TULIPA**

australis . . . . .	0,50	Greigii . . . . .	1,—
clusiana . . . . .	0,50	Kaufmanniana . . . . .	1,—
Didieri . . . . .	0,50	Marjoletti . . . . .	0,50
Eichleri . . . . .	1,—	mauriana . . . . .	0,50
Foersteriana . . . . .	1,—	praecox . . . . .	0,50
fulgens . . . . .	1,—	saxatilis . . . . .	0,50
gallica . . . . .	0,50	sylvestris . . . . .	0,50

Ces espèces botaniques peuvent très bien être plantées dans la rocaille. Elles fleurissent de bonne heure au printemps.

M	<b>Tunica</b> graminea . . . . .	0,50
R M	— Saxifraga . . . . .	0,50
	— var. alba . . . . .	0,50
	— « Rijnstroom » . . . . .	1,—
R M	<b>Umbilicus</b> persicus . . . . .	1,—
Voir en outre Cotyledon.		
R	<b>Uropetalum</b> serotinum . . . . .	1,50

R O	<b>Uvularia</b> grandiflora . . . . .	1,—
R O	— sessilifolia . . . . .	1,50
R Sp Pal	<b>Vaccinium</b> macrocarpum . . . . .	1,50
R O	— Myrtillus . . . . .	1,50
Sp	— Oxycoccus . . . . .	1,50
R ●	— uliginosum . . . . .	2,50
R ●	— Vitis-Idaea . . . . .	1,50
Pal	<b>Valeriana</b> dioica . . . . .	0,50
R M	— montana . . . . .	0,50
H Med	— officinalis . . . . .	0,50
R	— rotundifolia . . . . .	1,50
M	— salunca . . . . .	1,—
R M	— supina . . . . .	1,—
R M	— tripteris . . . . .	0,50
Aq	<b>Vallisneria</b> spiralis . . . . .	1,—
	<b>Vancouveria</b> , voir Epimedium.	
M	<b>Vella</b> glabrescens . . . . .	1,50
R	<b>Veratrum</b> album . . . . .	1,—
R	— nigrum . . . . .	1,50
V	<b>Verbascum</b> olympicum . . . . .	0,75
V	— creticum . . . . .	0,75
R	— phoeniceum . . . . .	0,50
R Tap	<b>Verbena</b> radicans . . . . .	0,75
R Bo	— venosa . . . . .	1,—
V +	<b>Vernonia</b> glauca . . . . .	0,75

Grandes composées d'automne à fleurs carmin vif.

R M Tap	<b>Veronica</b> Allionii . . . . .	0,75
R M	— alpina . . . . .	1,—
R M	— armena . . . . .	0,50
R	— austriaca multifida . . . . .	0,75
R	— balkanica . . . . .	1,—
R	— bellidifolia . . . . .	0,50
M	— Buchananii . . . . .	1,50
R	— Bulleyana . . . . .	1,50
M	— caespitosa . . . . .	1,—
R	— carnea . . . . .	0,75
R	— cinerea . . . . .	0,60
R Pr Tap	— Chamaedrys . . . . .	0,50
R	— crassifolia . . . . .	1,—
R	— cupressoides . . . . .	1,50
R Tap	— filiformis . . . . .	0,50

Plante gazonnante très propre à former rapidement des tapis. Fleurs bleues.

R M	— fruticulosa . . . . .	0,50
R	— gentianoides . . . . .	0,50
	— angustifolia . . . . .	0,75
R	— Hectori . . . . .	1,50
R	— incana . . . . .	0,50
R M	— Kotschyi . . . . .	1,—
R	— multifida . . . . .	0,75
R □	— officinalis . . . . .	0,50
V +	— paniculata (maritima)	
	longifolia) . . . . .	0,50
	— vars. alba fol. var.	
	et rosea . . . . .	0,75
R	— peduncularis . . . . .	0,50
R	— pinguaeolia . . . . .	1,50
R Bo Tap	— prostrata . . . . .	0,50
R Bo	— Royal Blue . . . . .	0,50
R	— rupestris . . . . .	0,50
	— var. alba et rosea . . . . .	0,75
R M	— saturoioides . . . . .	0,60
R M	— saxatilis . . . . .	0,50
	— alba . . . . .	1,—
R H	— serpyllifolia . . . . .	0,50
R	— spicata . . . . .	0,50



		Fr.
	<b>Veronica (suite)</b>	
	— spicata vars. alba, Erica, nana et rosea . . . . .	0,60
R M	— <del>surculosa</del> . . . . .	0,50
R Pr	— Teucrium . . . . .	0,50
R	— True Blue . . . . .	0,75
R	— <del>verrucosa</del> . . . . .	1,50
R	— Warley White . . . . .	1,50
R	— Whitali . . . . .	1,—
	Voir aux arbustes.	
R M	<b>Vesicaria</b> utriculata . . . . .	0,50
Aq	<b>Villarsia</b> (Limnanthemum) nym- phoides . . . . .	1,—
R □	<b>Vinca</b> acutiflora (difformis) . .	0,50
R Bo	— herbacea . . . . .	0,50
R Bo	— major . . . . .	0,50
	— vars. fol marginata et reticulata . . . . .	0,75
R □	— minor . . . . .	0,25
	— angustifolia et fl. pl. . . . .	0,75

## VIOLA

### a) Groupe Violettes.

R	<b>Viola</b> arenaria . . . . .	0,75
R N	— biflora (dz. 4,—) . . . . .	0,50
R N	— canadensis . . . . .	0,50
R	— cucullata . . . . .	0,50
R	— cyanea . . . . .	0,50
R □	— declivis (à parfum suave) . . .	0,50
R	— dissecta . . . . .	0,50
R	— eisanensis . . . . .	2,50
H	— elatior . . . . .	0,50
R	— hirta . . . . .	0,50
R	— Jooi . . . . .	0,50
R	— lanceolata . . . . .	0,60
□	— mirabilis . . . . .	0,50
V	— odorata (Violette) . . . . .	0,25
	— vars. rubra et sul- furea . . . . .	0,75
T Sp	— palustris . . . . .	1,—
R	— papilionacea . . . . .	0,75
	— var. confederata . . . . .	0,75
R	— pinnata . . . . .	1,—
R	— pyrenaica . . . . .	0,50
R	— sulfurea (Vilmoriniana) . . . .	0,75
R	— Wiedmannii . . . . .	0,60
	<b>Violettes</b> des jardins, à grandes fleurs, Le Czar, pour bordures et couches à forcer . . . . .	0,50

		Fr.
	<b>b) Groupe Pensées.</b>	
R	<b>Viola</b> altaica . . . . .	1,—
R	— bosniaca . . . . .	0,50
R	— calcarata . . . . .	0,60
	— alba . . . . .	1,—
Mo M	— cenisia . . . . .	1,50
R	— cornuta . . . . .	0,50
	— vars. alba. grandi- flora, lutea, « Rose Queen », « Wermig » . . . . .	0,50
R	— florariensis . . . . .	0,50
	Variété très florifère, hybride des cornuta et rothomagensis, qui, d'un bout de l'année à l'autre, porte des fleurs semblables à celles de la Pensée des Alpes. C'est l'une des plus faciles d'entre les plantes de jardins et de rochers.	
R	— gracilis . . . . .	0,50
	— alba grandiflora . . . . .	1,—
	— Lord Nelson . . . . .	0,60
	— Mrs. Bowles . . . . .	0,60
	— Purple Robe . . . . .	0,60
	— robusta . . . . .	0,50
	— sulfurea . . . . .	0,50
M	— heterophylla . . . . .	1,—
R	— lutea . . . . .	0,50
	— grandiflora . . . . .	0,60
R	— Munbyana . . . . .	1,—
	— nigra . . . . .	0,50
Mo M	— nummulariaefolia . . . . .	2,50
R	— pubescens . . . . .	1,—
R M	— rothomagensis . . . . .	0,75
	— splendida . . . . .	0,50
R M	— Zoysii . . . . .	2,50
R M	— Valderia . . . . .	2,50
R	<b>Vittadenia</b> triloba (Erigeron mu- cronatus . . . . .	0,50
	L'une des meilleures plantes pour murs au soleil.	
	<b>Wahlenbergia</b> , voir Edrayan- thus.	
R	<b>Waldsteinia</b> geoides . . . . .	1,—
R O	<b>Wulfenia</b> carinthiaca . . . . .	0,50
	— alba . . . . .	1,—
	<b>Yucca</b> angustifolia . . . . .	1,50
	— elata . . . . .	1,50
	— glabra . . . . .	1,50
	— pendula . . . . .	1,50
	— recurvifolia . . . . .	1,50
R M	<b>Xatardia</b> scabra (des Pyrénées) . .	1,50
R S +	<b>Zauschneria</b> californica . . . . .	0,75
R S +	— canescens . . . . .	1,50
	— splendens . . . . .	1,—
R	<b>Zygadenus</b> Fremonti . . . . .	1,50
R	<b>Zwackia</b> aurea . . . . .	1,—



## ORCHIDÉES RUSTIQUES

Nous adoptons ici la nomenclature suivie dans le volume: Album des Orchidées d'Europe par H. Correvon. Ce livre qui traite des Orchidées pouvant se cultiver dans nos jardins, est en vente à Floraire au prix de 20 fr. Il est illustré de 60 planches coloriées et contient la description et le mode de culture de ces espèces.

	Fr.		Fr.
<b>Aceras</b> anthropophora . . . . .	1,—	<b>Orchis</b> fusca . . . . .	2,50
— longibracteata . . . . .	2,50	— globosa . . . . .	0,75
<b>Anacamptis</b> pyramidalis . . . . .	0,75	— incarnata et latifolia . . . . .	1,—
<b>Bletilla</b> hyacinthina et verrecunda . . . . .	1,—	— intacta . . . . .	1,—
<b>Cephalanthera</b> rubra . . . . .	1,50	— lactiflora . . . . .	1,—
— ensifolia . . . . .	1,—	— maculata . . . . .	0,75
<b>Coeloglossum</b> viride . . . . .	1,50	— mascula et militaris . . . . .	0,75
<b>Cypripedium</b> acaule . . . . .	3,50	— Morio . . . . .	0,75
— Calceolus . . . . .	1,—	— — alba . . . . .	1,—
— californicum . . . . .	3,50	— — rosea . . . . .	1,—
— japonicum . . . . .	10,—	— — rubra . . . . .	1,—
— macranthum . . . . .	2,50	— pallens . . . . .	1,—
— parviflorum . . . . .	2,50	— sambucina (jaune ou rose) . . . . .	0,75
— pubescens . . . . .	2,50	— Simia et ustulata . . . . .	0,75
— spectabile . . . . .	2,50	<b>Platanthera</b> bifolia . . . . .	1,—
<b>Epipactis</b> palustris . . . . .	1,—	<b>Spinanthes</b> aestivalis . . . . .	1,50
<b>Goodyera</b> repens . . . . .	1,—		
<b>Gymnadenia</b> albida . . . . .	1,—		
— conopea . . . . .	0,75		
— odoratissima . . . . .	1,—		
<b>Himantoglossum</b> hircinum . . . . .	1,50		
<b>Listera</b> ovata . . . . .	1,—		
<b>Nigritella</b> angustifolia . . . . .	1,—		
— rosea . . . . .	1,—		
<b>Ophrys</b> apifera, Arachnites, aranifera . . . . .	1,—		
— muscifera . . . . .	0,75		

### Collections à notre choix.

Nous faisons des collections d'Orchidées de plein air composées selon les conditions de culture qui nous sont indiquées, aux prix de :

50 Orchidées de plein air, en 25 esp. . . . .	35,—
25 " " " " différentes . . . . .	20,—
12 " " " " différentes . . . . .	10,—



*Cypripedium japonicum*



# PLANTES ARBUSTIVES POUR ROCAILLES ET JARDINS

Nous établissons ici des prix de base, qui peuvent être modifiés suivant la force des plantes.

	Fr.		Fr.
<b>Abelia chinensis</b> (rupestris) . . . . .	1,50	<b>Cytisus austriacus</b> , Beanii, capitatus, caucasicus, Laburnum, ponticus, purpureus, radiatus, Rochelii, spachianus . . . . .	2,50
— <b>longituba</b> (Schumanni) . . . . .	1,50	<b>Desmodium canadense</b> . . . . .	1,50
<b>Acer palmatum atropurpureum</b> . . . . .	5,—	— <b>penduliflorum</b> . . . . .	2,50
<b>Akebia quinata</b> . . . . .	1,50	<b>Evonymus obovata</b> et <b>Kewensis</b> . . . . .	1,—
<b>Amelanchier pumila</b> . . . . .	1,50	— <b>radicans</b> fol. var. . . . .	1,50
<b>Ampelopsis sempervirens</b> . . . . .	1,50	<b>Eucalyptus globulus</b> . . . . .	2,50
— <b>Veitchii</b> (tricuspidata) . . . . .	1,50	<b>Genista alba</b> . . . . .	1,50
<b>Amygdalus nana</b> . . . . .	1,—	— <b>anglica</b> . . . . .	2,50
<b>Andrachne colchica</b> . . . . .	1,50	— <b>anxantica</b> . . . . .	1,50
<b>Atriplex confertifolia</b> . . . . .	2,—	— <b>ardoini</b> . . . . .	1,—
<b>Aucuba variés</b> . . . . .	2,50	— <b>dalmatica</b> . . . . .	1,50
<b>Berberis atropurpurea</b> , <b>candidula</b> , <b>Darwinii</b> , <b>Sargentiana</b> , <b>stenophylla</b> , <b>Thunbergii</b> et <b>Veitchii</b> . . . . .	1,50 à 2,50	— <b>ephedroides</b> . . . . .	1,—
— <b>replicata</b> . . . . .	2,50	— <b>foliata</b> . . . . .	1,50
— <b>verruculosa</b> . . . . .	2,50	— <b>hispanica</b> . . . . .	2,50
<b>Betula Medwediewii</b> . . . . .	1,50	— <b>horrida</b> . . . . .	1,— et 2,50
— <b>nana</b> . . . . .	1,50	— <b>junceae</b> ( <b>Spartium</b> ) . . . . .	1,50
— <b>humilis</b> . . . . .	1,50	— <b>occidentalis</b> . . . . .	1,50
<b>Bignonia grandiflora</b> . . . . .	2,50	— <b>ovata</b> . . . . .	1,—
— <b>radicans</b> . . . . .	1,50	— <b>pilosa</b> . . . . .	0,75
<b>Buddleia alternifolia</b> . . . . .	2,50	— <b>prostrata</b> ( <b>Halleri</b> ) . . . . .	2,50
<b>Buxus sempervirens</b> . . . . .	1,50	— <b>purgans</b> . . . . .	1,—
— — <b>var. longifolia</b> . . . . .	2,50	— <b>radiata</b> . . . . .	1,50
<b>Caryopteris Mastacanthus</b> . . . . .	1,50	— <b>sericea</b> . . . . .	2,50
<b>Ceanothus Gloire de Versailles</b> . . . . .	2,50	— <b>sulphurea</b> . . . . .	1,50
<b>Cedrus deodora</b> . . . . .	15,— à 20,—	— <b>Villarsii</b> ( <b>Genêt pygmée</b> ) . . . . .	1,50
<b>Cercocarpus parviflorus</b> . . . . .	2,50	<b>Hedera conglomerata</b> (nain et aggloméré; propre pour rocailles) . . . . .	1,50
<b>Choisya ternata</b> . . . . .	2,50	— <b>densa</b> . . . . .	1,50
<b>Clematis coccinea</b> . . . . .	1,50	<b>Hypericum densiflorum</b> . . . . .	2,50
— <b>Douglasii</b> . . . . .	1,50	— <b>Forrestii</b> . . . . .	2,50
— <b>Flammula</b> . . . . .	1,—	— <b>Henryi</b> . . . . .	2,50
— <b>Mandschurica</b> . . . . .	1,50	— <b>patulum</b> . . . . .	1,50 à 2,50
— <b>montana</b> . . . . .	1,—	— — <b>var. grandiflorum</b> . . . . .	2,50
— — <b>vars. grandiflora</b> , <b>rosea</b> et <b>rubra</b> . . . . .	1,50	<b>Itea virginica</b> . . . . .	1,50
— <b>Spooneri</b> . . . . .	1,50	<b>Jasminum nudiflorum</b> . . . . .	1,50
— <b>tangutica</b> . . . . .	1,50	— <b>primulinum</b> . . . . .	2,50
<b>Clerodendron foetidum</b> . . . . .	1,50	<b>Kolkwitzia amabilis</b> . . . . .	2,50
— <b>trichotonum</b> . . . . .	5,—	<b>Laurus nobilis</b> . . . . .	1,50
<b>Cognassier</b> ou <b>Poirier du Japon</b> , <b>vermillon</b> . . . . .	5,—	<b>Lonicera Caprifolium</b> . . . . .	1,50
<b>Cotoneaster adpressa</b> , <b>ambigua</b> , <b>amoena</b> , <b>bullata</b> , <b>congesta</b> , <b>divaricata</b> , <b>Franchetti</b> , <b>glaucophylla v. vestita</b> , <b>horizontalis</b> ( <b>Davidiana</b> ), <b>horiz. fol. argentea varieg.</b> , <b>humifusa</b> , <b>microphylla</b> , <b>newryensis</b> , <b>praecox</b> , <b>rugosa</b> , <b>serotina</b> , <b>thymifolia</b> , <b>Wardii</b> , <b>Watereri</b> , <b>Wheerlii</b> . . . . .	de 1,— à 3,—	— <b>fuchsioïdes</b> ( <b>rouge vif</b> ) . . . . .	1,50
<b>Cupressus arizonica</b> et <b>glauca</b> . . . . .	de 2,50 à 5,—	— <b>chinensis</b> ( <b>idem</b> ) . . . . .	1,50
Superbes et des plus rustiques chez nous; vont jusqu'à près de 1000 mètres d'altitude et constituent l'un des plus beaux ornements des jardins; pyramides grisâtres, à verdure fine et gros cônes.		— <b>pileata</b> . . . . .	1,50
— <b>lusitanicus</b> . . . . .	1,50	— <b>pyrenaica</b> . . . . .	1,50
		— <b>rupicola</b> . . . . .	2,50
		— <b>splendida</b> ( <b>rare</b> ) . . . . .	2,50
		<b>Olearia nummularifolia</b> . . . . .	2,50
		<b>Osmanthus Delavayi</b> . . . . .	1,50
		<b>Passiflora coerulea</b> . . . . .	2,50
		<b>Pinus Halepensis</b> . . . . .	2,—
		<b>Polygonum Aubertii</b> . . . . .	2,50
		— <b>baldschuanicum</b> . . . . .	1,50
		<b>Rhamnus Perrieri</b> . . . . .	2,50
		— <b>saxatilis</b> . . . . .	2,50



<b>Rhaphitamnus chilensis</b> . . . . .	Fr. 1,50
<b>Rhododendron Chamaecistus</b> . . . . .	2,50
— ferrugineum . . . . .	5,—
— hirsutum . . . . .	5,—



Rhododendron chamaecistus

— macrostemon . . . . .	2,50
— obtusum amoenum . . . . .	2,50
— ovatum . . . . .	2,50
— praecox . . . . .	2,50 à 5,—
— yanthinum . . . . .	2,50 à 5,—
— yunnanense . . . . .	2,50

Bonnes variétés pour rocailles. Ombre ou demi-ombre; terre de bruyère.

<b>Rhus Cotinus var. atropurpureus</b> . . . . .	2,50
<b>Rosa alpina</b> . . . . .	1,50
— berberidifolia (persica) . . . . .	5,—
— eglanteria et lutea . . . . .	2,50
— moschata (la rose de Shakespeare). . . . .	1,50
— mutabilis . . . . .	1,50
— pimpinellifolia (spinosissima) . . . . .	1,50
— rubiginosa . . . . .	1,50
— Rouletti . . . . .	1,—

Le plus nain de tous les Rosiers introduit par nous en 1920.

— Watsoniana . . . . .	1,50
<b>Rose, var. Charles Bonnet</b> . . . . .	1,50
Excellente, sans épines, parfumée et remontante.	
<b>Ruscus aculeatus</b> . . . . .	1,50
— racemosus (Danae) . . . . .	1,50

<b>Rubus bambusaeformis</b> . . . . .	Fr. 2,—
— australis . . . . .	2,—
<b>Salix arbuscula, Cottetii, Mooreana.</b> . . . .	1,50
<b>Sarcococca ruscifolia</b> . . . . .	2,50
<b>Skimmia fragrantissima</b> . . . . .	2,50
— japonica . . . . .	2,50
<b>Shepherdia argentea</b> . . . . .	2,—
<b>Spiraea Thunbergii</b> . . . . .	2,50
<b>Tamarix aestivalis</b> . . . . .	2,50
<b>Ulex europaeus</b> . . . . .	1,50
— fl. doubles . . . . .	1,50
— nanus . . . . .	2,50
<b>Veronica Hulkeana, obovata, Traversii</b> . . . . .	2,50
<b>Viburnum Carlesii</b> . . . . .	2,50
— Harryanum . . . . .	2,50
<b>Wistaria multijuga et var. alba</b> . . . . .	2,50
— sinensis . . . . .	2,50
Glycine du Japon aux grappes de fleurs dépassant un mètre.	



Rosa Rouletti.

### Collections à notre choix.

50 arbustes différents . . . . .	60,—
25 " " . . . . .	35,—
10 " " . . . . .	15,—

« **FLORAIRE** ». Un nouveau livre de M. H. Correvois :

**Genèse et développement d'un jardin séculaire**

15 planches, 145 pages

Fr. 7.50



## FOUGÈRES RUSTIQUES

La nomenclature suivie ici est celle de Hooker que nous avons adoptée pour notre ouvrage.  
Les Fougères Rustiques, aujourd'hui épuisé.

	Fr.		Fr.
<b>Adiantum</b> Capillus-Veneris . . . . .	1,—	<b>Nephrodium</b> (suite)	
— emarginatum . . . . .	2,50	— — vars. crenatum, crispum, cris-	
— pedatum . . . . .	1,50	— — tatum . . . . .	1,50
<b>Aspidium</b> acrostichoides . . . . .	1,50	— montanum (Oreopteris) . . . . .	1,50
— angulare . . . . .	1,50	— rigidum (Villarsii) . . . . .	1,50
— Braunii . . . . .	1,50	— spinulosum . . . . .	1,—
— Clintonianum . . . . .	2,50	— Thelypteris . . . . .	1,—
— crenatum . . . . .	1,50	<b>Nothochlaena</b> Marantae . . . . .	2,50
— lobatum . . . . .	1,—	<b>Onychium</b> japonicum . . . . .	2,50
— Lonchitis . . . . .	1,—	<b>Onoclea</b> (Struthiopteris) germanica . . . . .	0,50
<b>Asplenium</b> angustifolium . . . . .	1,50	— orientalis (pennsylvanica) . . . . .	2,50
— Ceterach (Ceterach officinarum) . . . . .	0,75	— sensibilis . . . . .	1,—
— Filix-femina (Athyrium) . . . . .	0,75	<b>Ophioglossum</b> vulgatum . . . . .	1,—
— — Frizeliae, Howardi, plumosum,		<b>Osmunda</b> cinnamomea . . . . .	2,50
— Victoriae . . . . .	2,—	— gracilis . . . . .	1,50
— fontanum (Halleri) . . . . .	1,—	— regalis (Fougère royale) . . . . .	1,50
— germanicum . . . . .	2,50	<b>Polypodium</b> Dryopteris . . . . .	1,—
— Ruta-muraria . . . . .	0,50	— lingua . . . . .	2,—
— septentrionale . . . . .	1,50	— Robertianum (calcareum) . . . . .	1,50
— Trichomanes . . . . .	0,50	— vulgare . . . . .	1,—
— viride . . . . .	1,—	<b>Polystichum</b> , voir Aspidium.	
<b>Athyrium</b> , voir Asplenium.		<b>Pteris</b> aquilina . . . . .	1,50
<b>Blechnum</b> occidentale et Spicant . . . . .	1,50	— cretica . . . . .	1,50
<b>Botrychium</b> Lunaria . . . . .	1,—	<b>Scelopendrium</b> vulgare . . . . .	0,75
<b>Ceterach</b> officinarum . . . . .	0,75	— vars. crispum, laceratum et undu-	
<b>Cheilanthes</b> fragrans . . . . .	2,50	— — latum . . . . .	1,50
— hispanica . . . . .	2,50	<b>Selaginella</b> caulescens . . . . .	2,50
<b>Cyrtomium</b> (Aspidium) falcatum . . . . .	1,50	La seule esp. ce arbustive rustique.	
<b>Cystopteris</b> alpina . . . . .	1,50	— Douglasii . . . . .	1,—
— fragilis . . . . .	1,—	— helvetica . . . . .	1,—
— montana . . . . .	1,50	— hortensis . . . . .	1,—
<b>Dictyogramme</b> japonica . . . . .	5,—		
<b>Lastrea</b> , voir Nephrodium.		<b>Collections à notre choix.</b>	
<b>Nephrodium</b> decursivopinnatum . . . . .	2,50	50 Fougères différentes . . . . .	50,—
— dilatatum . . . . .	1,—	25 » » . . . . .	25,—
— Filix-mas . . . . .	1,—	12 » » . . . . .	15,—

## CONIFÈRES NAINS POUR ROCAILLES

de fr. 3,— à 5,— suivant la force

<b>Abies</b> taxoniana.	<b>Picea</b> excelsa (suite)
<b>Chamaecyparis</b> lawsoniana Fletcheri.	— — pumila glauca.
— — minima glauca.	— — pyramidalis.
— nutkaensis compacta glauca.	— orientalis nana.
— obtusa gracilis.	— pungens glauca.
— — nana.	<b>Pinus</b> Cembra (Arolle).
<b>Juniperus</b> chinensis pfitzeriana.	— montana.
— formosa.	— Mughus.
— japonica argentea variegata.	— Pumilio.
— — aurea.	— uncinata.
— sabina.	<b>Taxus</b> baccata adpressa.
— squamata Meyeri.	<b>Thuja</b> occidentalis globosa nana.
— tripartita.	— — Little Gem.
<b>Picea</b> excelsa Clanbrasiliana.	<b>Thuyopsis</b> dolabrata.
— — Maxwellii.	



# OUVRAGES DE M. HENRY CORREVEON

Dr ÈS SCIENCES HONORIS CAUSA

## OUVRAGES ÉPUISÉS:


Les Plantes des Alpes, Genève, 1885 . . . . .	Epuisé
Les Fougères rustiques, Genève, 1890 . . . . .	»
Les Orchidées rustiques, Genève, 1893 . . . . .	»
Le jardin de l'herboriste, Genève, 1896 . . . . .	»
Flore coloriée de poche, 2 <sup>me</sup> édition . . . . .	»
Flora tascabile, 2 <sup>me</sup> édition . . . . .	»
Les plantes alpines et de rocailles . . . . .	»
Les fougères de pleine terre . . . . .	»
Les iris dans les jardins (Correvec et Massé) . . . . .	»
Nos cimetières (publié par les soins de la commission d'art public) . . . . .	»
Culture des plantes alpines dans le Sphagnum . . . . .	»
Atlas de la flore alpine (édité par les soins du Club alpin), 6 vol. avec 500 planches coloriées . . . . .	»
Par monts et par vauz (coursées de montagne) . . . . .	»
Nos arbres, un volume in-8° . . . . .	»

## EN VENTE A FLORAIRE:

Della cultura delle piante alpine nelle regioni secche e aride . . . . .	Fr. 1,—
Album des Orchidées de l'Europe (2 <sup>me</sup> édition, augmentée et transformée, avec 66 planches coloriées) . . . . .	» 20,—
La flore alpine, un volume richement illustré (3 <sup>me</sup> édition entièrement revue et transformée) . . . . .	» 30,—
The Alpine Flora, translated into English by Mr. E.-W. Clayforth; a wonderful book with 180 pictures of alpine plants in watercolours . . . . .	» 25,—
Die Alpenblumen, « Flore alpine », traduite en allemand . . . . .	» 25,—
Champs et bois fleuris, suite de « Fleurs des Champs et des Bois », avec 75 planches coloriées par M <sup>lle</sup> S. Rivier . . . . .	» 30,—
Les plantes des montagnes et des rochers, leur acclimatation et leur culture dans les jardins. C'est, d'après les journaux horticoles, <i>le vade-mecum indispensable à tout amateur de plantes alpines</i> . . . . .	» 10,—
Alpeplanter og deres dyrkning, le même ouvrage que ci-dessus, traduit en danois . . . . .	Kr. 9,50
Plantes et santé, publié en 1917, 2 <sup>me</sup> édition 1923, illustré . . . . .	Fr. 5,—
Nos arbres dans la nature, contenant 100 magnifiques planches en couleurs . . . . .	» 10,—
Unsere Bäume, le même volume traduit en allemand . . . . .	» 10,—
Les Joubarbes (Sempervivum), un volume in-12. Leur classification, leur culture. S'adresser aux nombreux collectionneurs de ces plantes. Relié toile . . . . .	» 5,—
Rock Garden and Alpine Plants, on rockgardening, culture of plants, etc. Illustrated and binded . . . . .	» 16,—
« Floraire », Genève et développement d'un jardin séculaire. Un volume in-8°, avec 15 planches . . . . .	» 7,50
Fleurs des Champs et des Bois. Nouvelle édition (3 <sup>me</sup> ) populaire, entièrement transformée: 64 planches coloriées et 15 nouveaux dessins à la plume, 188 pages de texte . . . . .	» 12,—
Champs et Bois fleuris. Nouvelle édition, entièrement transformée . . . . .	» 12,—
Fleurs Aquatiques et des Marais, en préparation. 32 planches coloriées par Paul Robert et M <sup>lle</sup> Rivier . . . . .	» 12,—

Apply to « Floraire ».





*Cliché Echo des Alpes*





TRADE DISCOUNT 25 %  
HORTICULTEURS . RABAIS 25 %  
HANDELSGAERTNER . RABATT 25 %

# PLANTES ALPINES & VIVACES

## European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.  
Paper version of this catalogue hold by:  
Marianne-Foerster-Stiftung  
Digital version sponsored by:  
C.A.Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)

CHÈNE-BOURG - GENÈVE (SUISSE)